Инструкция по применению
Эвалар Ци-Клим Аланин Таблетки 400 мг 40 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Эвалар
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Бета-аланин
Количество в упаковке: 40
Дозировка действующего вещества: 400 мг

Действующее вещество

Бета-аланин

Состав

Действующее вещество: бета-аланин – 400 мг. Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая – 69,33 мг, крахмал картофельный – 26,55 мг, мальтодекстрин – 19,47 мг, кремния диоксид коллоидный – 11,00 мг, тальк – 11,00 мг, кроскармеллоза натрия – 8,25 мг, кальция стеарат – 4,40 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Приливы, обусловленные климактерическим периодом.

Способ применения и дозы

Препарат применяют внутрь. По 1-2 таблетки ежедневно. Доза может быть увеличена до 3-х таблеток в день. Длительность лечения от 5-10 дней до исчезновения приливов. При возобновлении симптомов следует провести повторный курс лечения. В связи с тем, что привыкания к препарату не возникает, лечение может быть продлено на весь период вазомоторных клинических расстройств без ограничения его продолжительности.

Противопоказания

Противопоказания Повышенная чувствительность к бета-аланину или любому из вспомогательных веществ препарата. С осторожностью Перед началом приема препарата рекомендуется проконсультироваться с врачом. Применение при беременности и в период грудного вскармливания Препарат не предназначен для применения в период беременности и грудного вскармливания. Побочное действие Очень редко: кожные аллергические реакции (зуд, сыпь). Очень редко: преходящие парестензии, как правило, в конечностях. Передозировка Случаи передозировки препарата не зарегистрированы. В случае передозировки препарата проводить симптоматическую терапию. Взаимодействие с другими лекарственными средствами Клинически значимых взаимодействий препарата с другими лекарственными средствами не выявлено. Особые указания Привыкания к препарату нет, курс лечения может быть назначен на протяжении всего периода вазомоторных клинических нарушений. Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора и т.п.).

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат не предназначен для применения в период беременности и грудного вскармливания.

Побочные действия

Очень редко: кожные аллергические реакции (зуд, сыпь). Очень редко: преходящие парестезии, как правило, в конечностях.

Передозировка

Случаи передозировки препарата не зарегистрированы. В случае передозировки препарата проводить симптоматическую терапию.

Взаимодействие с другими препаратами

Клинически значимых взаимодействий препарата с другими лекарственными средствами не выявлено.

Особые указания

Привыкания к препарату нет, курс лечения может быть назначен на протяжении всего периода вазомоторных клинических нарушений.

Срок хранения после открытия

3.0

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.