Инструкция по применению
Ци-Клим Капли для приема внутрь 50 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Россия
Производитель: Эвалар
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Цимицифуги кистевидной корневищ экстракт
Количество в упаковке: 1

Действующее вещество

Цимицифуги кистевидной корневищ экстракт

Состав

Активный компонент: цимицифуги кистевидной корневищ с корнями экстракт жидкий* – 12 г, что эквивалентно 2,4 г цимицифуги кистевидной корневищ с корнями. Вспомогательные вещества: сахарин – 0,050 г, мяты перечной листьев масло – 0,004 г, этанол (спирт этиловый) 95 % –28,125 г, вода – 59,821 г. Содержание этанола: 35,0-40,0 % (объемные). * Цимицифуги кистевидной корневищ с корнями экстракт жидкий изготовлен из цимицифуги кистевидной корневищ с корнями, этанола (спирта этилового) 95 % и воды, соотношение сырья к полученному экстракту 1:5.

Форма выпуска

Капли

Показания

Вегето-сосудистые расстройства в период менопаузы, пре-, и постменопаузы (приливы, повышенная потливость, нарушение сна, повышенная нервная возбудимость, изменение настроения, апатия и др.) в составе комплексной терапии.

Способ применения и дозы

Способ применения и дозы Внутрь, по 30 капель 2 раза в день в одно и то же время суток (утром и вечером). Длительность лечения определяется врачом.

Противопоказания

Противопоказания Повышенная чувствительность к компонентам препарата, алкоголизм. Нельзя применять для лечения пациентов с эстроген-зависимыми опухолями. С осторожностью Заболевания печени, эпилепсия, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга (применение возможно только после консультации врача). Применение при беременности и в период грудного вскармливания Препарат не следует применять во время беременности и в период грудного вскармливания. Побочное действие Возможны аллергические реакции. В редких случаях возможно появление боли в эпигастральной области. Возможно увеличение массы тела. Очень редко появляются чувство напряжения в молочных железах и менструальноподобные кровотечения. Передозировка Случаи передозировки и интоксикации на настоящее время неизвестны. Взаимодействия с другими лекарственными средствами в настоящее время неизвестны. Особые указания Без консультации врача препарат не следует применять более 3 месяцев. В составе препарата содержится 35,0-40,0 % этанола (в объемном отношении). Разовая доза препарата (30 капель) содержит 0,33 г абсолютного этилового спирта, суточная доза (60 капель) – 0,66 г абсолютного этилового спирта. При наступлении беременности необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу. В процессе хранения капель для приема внутрь возможно помутнение и выпадение осадка, что не влияет на эффективность препарата. Перед употреблением взбалтывать! Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами В период применения препарата следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат не следует применять во время беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. В редких случаях возможно появление боли в эпигастральной области. Возможно увеличение массы тела. Очень редко появляются чувство напряжения в молочных железах и менструальноподобные кровотечения.

Передозировка

Случаи передозировки и интоксикации на настоящее время неизвестны.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействия с другими лекарственными средствами в настоящее время неизвестны.

Особые указания

Без консультации врача препарат не следует принимать более 3 месяцев. В составе препарата содержится 35,0-40,0% этанола (в объемном отношении). Разовая доза препарата (30 капель) содержит 0,33 г абсолютного этилового спирта, суточная доза (60 капель) - 0,66 г абсолютного этилового спирта. При наступлении беременности необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу. В процессе хранения капель для приема внутрь возможно помутнение и выпадение осадка, что не влияет на эффективность препарата. Перед употребление взбалтывать!

Срок хранения после открытия

3.0

Условия хранения

При температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.