Инструкция по применению
Цикло 3 Форт Капсулы 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Франция
Производитель: Pierre Fabre
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гесперидин
Количество в упаковке: 30

Описание

Препарат представляет собой твердые желатиновые капсулы (размер 1). Крышечка - непрозрачная, оранжевого цвета, корпус - непрозрачный, желтого цвета.Содержимое капсул - порошок от желтого до коричневато-желтого цвета с вкраплениями более темного и более светлого цвета. Допускается наличие комков и спрессованной массы.

Действующее вещество

Гесперидин

Состав

Препарат Цикло 3® Форт содержит: Действующими веществами являются иглицы колючей корневищ экстракт, гесперидин метилхалкон и аскорбиновая кислота (витамин С). Каждая капсула содержит 150 мг иглицы колючей корневищ экстракта, 150 мг гесперидин метилхалкона и 100 мг аскорбиновой кислоты. Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: тальк, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный безводный, макрогол 6000, титана диоксид (Е171), краситель хинолиновый жёлтый (Е104), краситель «солнечный закат жёлтый» (Е110), желатин. В составе оболочки капсулы содержится краситель «солнечный закат жёлтый» (Е110) (см. раздел 2).

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Цикло 3® Форт показан к применению у взрослых пациентов старше 18 лет для симптоматического лечения венозно-лимфатической недостаточности (с такими проявлениями, как тяжесть в ногах, боль, синдром «усталых» ног).

Способ применения и дозы

Всегда принимайте данный препарат в полном соответствии с данным листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Рекомендуемая доза: 2-3 капсулы в день. Путь и (или) способ введения Внутрь. Капсулу следует проглатывать целиком, не открывая, не разжёвывая, запивая стаканом воды. Препарат Цикло 3® Форт можно принимать независимо от приема пищи, в удобное время, разделив суточную дозу на 2-3 приема. Продолжительность терапии Рекомендуемая продолжительность лечения составляет один месяц. Если через 2 недели регулярного приема препарата положительных изменений не наблюдается, необходимо обратиться к врачу. Если Вы забыли принять препарат Цикло 3® Форт Примите следующую дозу в обычное время. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать разовую дозу, которую Вы забыли принять. При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение через 14 дней, необходимо обратиться к врачу.

Противопоказания

Не принимайте препарат Цикло 3® Форт: если у Вас аллергия на аскорбиновую кислоту (витамин С), гесперидин метилхалкон, иглицы колючей корневищ экстракт или любые другие компоненты препарата, если у Вас нарушения метаболизма железа (талассемия, гемохроматоз, сидеробластная анемия), ввиду наличия аскорбиновой кислоты в составе лекарственного препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. В качестве меры предосторожности предпочтительно не принимать препарат Цикло 3® Форт во время беременности. Неизвестно, проникает ли препарат в грудное молоко, поэтому не принимайте препарат Цикло 3® Форт в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам Цикло 3® Форт может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. Возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Цикло 3® Форт: Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10): понос (диарея), иногда сильный, быстро проходящий при прекращении лечения (см. раздел 2 «Особые указания»), боль в животе. Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100): бессонница, ощущение тяжести и дискомфорта в животе (диспепсия), тошнота, покраснение кожи на ограниченном участке тела (эритема), кожный зуд, мышечные спазмы, боль в руках и/или ногах. Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000): повышенная возбудимость, головокружение, понижение температуры рук и /или ног (похолодание конечностей), боль в венах, нарушение пищеварения (нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта), изъязвления полости рта (афтозный стоматит), отклонение показателя анализа крови, который может помочь врачу оценить функцию печени: повышение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ). Неизвестно (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно): боль в желудке, воспаление кишечника (микроскопический колит), кожная сыпь красного цвета (макул о папулезная эритема), крапивница. Сообщение о нежелательных реакциях Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств - членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете собрать больше сведений о безопасности лекарственного препарата.

Передозировка

Если Вы приняли препарата Цикло 3® Форт больше, чем следовало До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано. Приём избыточной дозы аскорбиновой кислоты (витамина С) может привести к развитию гемолитической анемии у пациентов с недостаточностью Г6ФД (глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы). Если Вы приняли препарата Цикло 3® Форт больше, чем следовало, сообщите об этом лечащему врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие лекарственные препараты, в том числе препараты растительного происхождения и препараты, отпускаемые 'false.

Особые указания

Подобно всем лекарственным препаратам Цикло 3® Форт может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. Возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Цикло 3® Форт: Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10): понос (диарея), иногда сильный, быстро проходящий при прекращении лечения (см. раздел 2 «Особые указания»), боль в животе. Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100): бессонница, ощущение тяжести и дискомфорта в животе (диспепсия), тошнота, покраснение кожи на ограниченном участке тела (эритема), кожный зуд, мышечные спазмы, боль в руках и/или ногах. Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1000): повышенная возбудимость, головокружение, понижение температуры рук и /или ног (похолодание конечностей), боль в венах, нарушение пищеварения (нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта), изъязвления полости рта (афтозный стоматит), отклонение показателя анализа крови, который может помочь врачу оценить функцию печени: повышение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ). Неизвестно (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно): боль в желудке, воспаление кишечника (микроскопический колит), кожная сыпь красного цвета (макул о папулезная эритема), крапивница. Сообщение о нежелательных реакциях Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств - членов Евразийского экономического союза. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете собрать больше сведений о безопасности лекарственного препарата. Российская Федерация 109012, Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1 Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения Телефон: +7 499 578 0220 Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru https://roszdravnadzor.gov.ruПеред приемом препарата Цикло 3® Форт проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. В случае развития диареи прекратите прием препарата и обратитесь к лечащему врачу (см. раздел «Побочные эффекты»). Аскорбиновая кислота может влиять на результаты лабораторных исследований концентрации глюкозы в крови,

концентрации билирубина, активности трансаминаз, концентрации молочной кислоты (лактата) и других параметров. При нарушениях венозного кровообращения максимальный эффект препарата Цикло 3® Форт обеспечивается сочетанием со здоровым образом жизни. Избегайте продолжительного пребывания на солнце и жаре, длительного нахождения в положении стоя, набора избыточной массы тела. Пешие прогулки и, в некоторых случаях, ношение специальных чулок, способствуют улучшению циркуляции крови. Дети и подростки Не давайте препарат детям в возрасте от 0 до 18 лет, поскольку безопасность и эффективность применения препарата Цикло 3® Форт у детей и подростков не установлены. Данные отсутствуют. Препарат Цикло 3® Форт содержит краситель «солнечный закат жёлтый» (Е110), который может вызвать аллергические реакции. Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения. Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его ещё раз. Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки. Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции. Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 14 дней Вам следует обратиться к врачу.Специальные исследования не проводились. При приеме препарата Цикло 3® Форт у некоторых людей может возникнуть головокружение (см. раздел «Побочные эффекты»). Если это произойдет с Вами, не управляйте транспортными средствами и не используйте потенциально опасные инструменты или механизмы.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.