# Инструкция по применению
# Циклодинон Таблетки покрытые пленочной оболочкой 30 шт

## Характеристики




Форма выпуска: Таблетки
Страна: Германия
Производитель: Bionorica
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Прутняка обыкновенного плодов экстракт
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 4 мг
Срок годности: 36.0

## Действующее вещество

Прутняка обыкновенного плодов экстракт

## Состав

1 таблетка содержит: Активное вещество: сухой экстракт плодов прутняка обыкновенного (Agnus castus) 3.2-4.8 мг, что соответствует 40 мг лекарственного растительного сырья.; Вспомогательные вещества: повидон, кремния диоксид коллоидный, крахмал картофельный, лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат.; Состав оболочки: тальк, титана диоксид (IV) (E171), железа оксид желтый (E172), индиготин (E132), макрогол 6000, эметакриловой и этакриловой кислот сополимер.;

## Форма выпуска

Таблетки

## Показания

\- нарушения менструального цикла; - предменструальный синдром; - мастодиния.

**Способ применения и дозы**

Препарат принимают внутрь по 1 таб. 1 раз/день, утром, не разжевывая, с небольшим количеством воды.; Лечение проводится в течение 3 месяцев, без перерыва во время менструации. После исчезновения симптомов и улучшения состояния следует продолжить лечение в течение нескольких недель.; Если после отмены препарата жалобы появляются вновь, необходимо проконсультироваться с врачом.

**Противопоказания**

\- индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Препарат не следует применять при беременности, а также в период грудного вскармливания.

**Побочные действия**

Редко: аллергические кожные реакции.; Имеются данные о редких случаях преходящего психомоторного возбуждения, спутанности сознания и галлюцинаций.

**Передозировка**

Случаи передозировки неизвестны.

**Взаимодействие с другими препаратами**

У пациентов, принимающих антагонисты дофаминовых рецепторов, возможно взаимное ослабление действия лекарственных средств.; Взаимодействие с другими лекарственными средствами до настоящего времени неизвестно.

**Особые указания**

В случае возникновения при приеме препарата болей в молочных железах и/или слабости, депрессии, а также в случае менструальных нарушений рекомендуется проконсультироваться с врачом.; Таблетки, покрытые оболочкой, содержат молочный сахар (лактозу).; Непереносимость лактозы может рассматриваться в качестве возможной причины болей в эпигастральной области и диареи.; Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами;Препарат не влияет на способность к вождению автомобиля и управлению механизмами.

**Условия хранения**

В сухом месте