Инструкция по применению
Циклоферон Таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 150 мг 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Полисан
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Меглюмина акридонацетат
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 150 мг
Срок годности: 24.0



Описание

Препарат Циклоферон содержит в качестве действующего вещества меглюмина акридонацетат. Циклоферон - иммуностимулирующее средство. Препарат является низкомолекулярным индуктором интерферона, что определяет широкий спектр его биологической активности (противовирусной, иммуномодулирующей, противовоспалительной и др.). Циклоферон эффективен в отношении вирусов герпеса, гриппа и других возбудителей острых респираторных заболеваний. Обладает прямым противовирусным действием, подавляя репродукцию вируса на ранних сроках (1 – 5-е сутки) инфекционного процесса, снижая инфекционность вирусного потомства, приводя к образованию дефектных вирусных частиц. Повышает неспецифическую резистентность организма в отношении вирусных и бактериальных инфекций.

Действующее вещество

Меглюмина акридонацетат

Состав

Действующим веществом является меглюмина акридонацетат. Каждая таблетка, покрытая кишечнорастворимой оболочкой, содержит 150 мг меглюмина акридонацетата. Прочими вспомогательными веществами являются повидон К 30, кальция стеарат, гипромеллоза, полисорбат 80. Кишечнорастворимая оболочка: метакриловой кислоты и этилакрилата сополимер [1:1], пропиленгликоль.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Абсорбция При приёме суточной дозы максимальная концентрация в плазме крови достигается через 2–3 часа, постепенно снижается к 8-му часу, а через 24 часа ЦИКЛОФЕРОН обнаруживается в следовых количествах. ЭлиминацияПериод полувыведения препарата составляет 4–5 часов, поэтому использование его в рекомендуемых дозах не создаёт условий для кумуляции в организме.

Показания

Препарат показан к применению у взрослых и детей с 4 лет. У взрослых в комплексной терапии: гриппа и острых респираторных заболеваний герпетической инфекции. Для постконтактной профилактики гриппа и ОРВИ. У детей с 4 лет в комплексной терапии: гриппа и острых респираторных заболеваний герпетической инфекции. У детей с 4 лет – для профилактики гриппа и острых респираторных заболеваний.

Способ применения и дозы

Способ применения Внутрь 1 раз в сутки за 30 мин до еды, не разжёвывая, запивая ½ стакана воды. Особые группы пациентовПациенты с печеночной недостаточностью Отсутствуют данные о неблагоприятном действии препарата ЦИКЛОФЕРОН на функции печени. Отсутствуют данные о необходимости коррекции дозы у лиц с нарушением функции печени. Пациенты с почечной недостаточностью Отсутствуют данные о неблагоприятном действии препарата ЦИКЛОФЕРОН на функции почек. Отсутствуют данные о необходимости коррекции дозы у лиц с нарушением функции почек. Пациенты пожилого возрастаОтсутствуют данные о неблагоприятном действии препарата ЦИКЛОФЕРОН или необходимости снижения дозировки при применении в пожилом возрасте.Режим дозирования Препарат принимают в возрастных дозировках: Взрослые: по 450–600 мг (3–4 таблетки) на приём. При лечении гриппа и острых респираторных заболеваний препарат принимают на 1, 2, 4, 6 и 8-е сутки (курс – 20 таблеток). Лечение необходимо начинать при первых симптомах заболевания. При тяжёлом течении гриппа в первый день принимают 6 таблеток. При необходимости дополнительно проводят симптоматическую терапию (жаропонижающие, болеутоляющие, отхаркивающие средства). При герпетической инфекции препарат принимают на 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 20 и 23-и сутки (курс – 40 таблеток). Лечение наиболее эффективно при появлении первых симптомов заболевания. Повторный курс целесообразно проводить через 2–3 недели после окончания первого курса. – Для постконтактной профилактики гриппа и ОРВИ при непосредственном контакте (не более 3 дней назад) с больными гриппом или ОРВИ препарат принимают по 4 таблетки (600 мг) в сутки на 1, 2, 4, 6 и 8-е сутки (курс – 20 таблеток). Если приём очередной дозы препарата пропущен, то следует при первой возможности без учета временного интервала и удвоения дозировки продолжить курс по начатой схеме. Дети Дети от 0 до 4 лет: безопасность и эффективность не установлены, данные отсутствуют Дети 4–6 лет: по 150 мг (1 таблетка) на приём Дети 7–11 лет: по 300–450 мг (2–3 таблетки) на приём Дети старше 12 лет: по 450–600 мг (3–4 таблетки) на приём. При гриппе и острых респираторных заболеваниях препарат принимают в возрастных дозах на 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 20 и 23-и сутки. Курс лечения составляет от 5 до 10 приёмов – в зависимости от тяжести состояния и выраженности клинических симптомов. При герпетической инфекции препарат принимают на 1, 2, 4, 6, 8, 11 и 14-е сутки лечения. Курс лечения может варьироваться в зависимости от тяжести состояния и выраженности клинических симптомов. Для экстренной неспецифической профилактики гриппа и острых респираторных заболеваний (при непосредственном контакте с больными гриппом или ОРЗ другой этиологии, в период эпидемии гриппа) препарат принимают на 1, 2, 4, 6, 8 сутки. Далее осуществляют перерыв на 72 часа (трое суток) и продолжают курс на 11, 14, 17, 20 и 23-и сутки. Общий курс составляет от 5 до 10 приёмов.

Противопоказания

Гиперчувствительность к меглюмину акридонацетату или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6.1 беременность и период грудного вскармливания (см. раздел 4.6) декомпенсированный цирроз печени дети до 4 лет (см. раздел 4.2).

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременность Безопасность применения препарата ЦИКЛОФЕРОН у беременных женщин не изучалась, поэтому применение препарата при беременности противопоказано. ЛактацияСведения о проникновении препарата ЦИКЛОФЕРОН в грудное молоко человека отсутствуют. Применение препарата в период грудного вскармливания противопоказано.

Побочные действия

Подобно всем другим лекарственным препаратам, Циклоферон может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. Наиболее серьёзной выявленной нежелательной реакцией при приёме препарата Циклоферон является ангионевротический отёк, однако он возникает очень редко (не более чем у 1 человека из 10 000). При появлении данной нежелательной реакции необходимо прекратить приём препарата и немедленно обратиться к врачу. Препарат может вызывать также другие, указанные ниже нежелательные реакции. Очень редко (не более чем у 1 человека из 10 000): сыпь крапивница.

Взаимодействие с другими препаратами

ЦИКЛОФЕРОН совместим со всеми лекарственными препаратами, применяемыми при лечении указанных заболеваний (интерфероны, химиотерапевтические, симптоматические лекарственные препараты и др.). Усиливает действие интерферонов и аналогов нуклеозидов. Уменьшает побочные эффекты химиотерапии, интерферонотерапии.

Срок хранения после открытия

2 года

Условия хранения

В сухом месте