Инструкция по применению
Цинарикс Таблетки 400 мг 60 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Австрия
Производитель: Montavit
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 60

Описание

Цинарикс является источником гидроксикоричных кислот, содержит дубильные вещества.Гидроксикоричные кислоты проявляют ярко выраженное антиоксидантное действие, являются одними из самых эффективных "ловушек" свободных радикалов, проявляют антимикробную, противогрибковую, антитоксическую и противовоспалительную активность. Усиливают выработку интерферонов - главного эндогенного фактора противовирусной защиты организма. Наряду с противовирусным и иммуномодулирующим действием гидроксикоричные кислоты повышают устойчивость организма к бактериям.Экстракт листьев артишока обладает комплексным воздействием на функциональное состояние печени, желчевыводящих путей и ЖКТ, содержит дубильные вещества. Нормализует обмен веществ. Стимулирует выделение желчи, усиливает моторную деятельность кишечника, снижает уровень холестерина и ЛПНП в крови, оказывает противорвотное действие и улучшает антитоксическую функцию печени.Антиоксиданты в составе экстракта листьев артишока способствуют формированию адекватного иммунного ответа, участвуют в подавлении процессов воспаления, усиливают активность белков, которые защищают организм от чужеродных агентов, а также стимулируют поглощение клетками иммунной системы инородных частиц, вирусов и бактерий.

Состав

1 таблетки массой 400 мг. экстракт листьев артишока колючего 55 мгВспомогательные вещества: целлактоза, кросповидон, коповидон - связующие агенты, наполнитель мальтодекстрин, антислеживающие агенты - кремния диоксид, тальк, магния стеарат, покрытие (сахароза, антислеживающие агенты - тальк, кальция карбонат, кремния диоксид, загуститель - камедь рожкового дерева, краситель - титана диоксид, связующий агент - повидон, загустители - глицерол (глицерин), метилцеллюлоза, покрывающие агенты - Эудражит Е и монтангликолевый воск, красители - хинолиновый желтый и индигокармин).

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В качестве источника дубильных веществ для поддержания функционального состояния ЖКТ, в том числе печени и желчевыводящих путей.

Способ применения и дозы

Внутрь, во время еды, по 1–2 табл. 3 раза в сутки. Курс лечения — 2–3 нед.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано при беременности и кормлении грудью.

Особые указания

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Беречь от детей