Инструкция по применению
Циндол ТФФ Суспензия для наружного применения 125 мл

Характеристики

Форма выпуска: Суспензия
Страна: Россия
Производитель: Тульская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Цинка оксид
Количество в упаковке: 1



Описание

Неоднородная взвесь с быстро выделяющимся после взбалтывания осадком белого или белого с сероватым оттенком цвета.

Действующее вещество

Цинка оксид

Состав

На 100 г: Действующее вещество: Цинка оксид 12,5 г Вспомогательные вещества: Тальк 12,5 г Крахмал картофельный 12,5 г Глицерол 20 г Спирт этиловый (этанол) 70 % 20 г Вода очищенная до 100 г

Форма выпуска

Суспензия

Показания

Дерматиты, язвы кожи, опрелости.

Способ применения и дозы

Наружно. Перед применением взбалтывать. Тампоном, смоченным препаратом, наносят суспензию на пораженные участки кожи 2-3 раза в сутки. Если после лечения улучшения не наступает или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно применение во время беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Возможны местные аллергические реакции: кожный зуд, гиперемия, сыпь. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки при наружном применении не описаны.

Взаимодействие с другими препаратами

Не изучалось.

Особые указания

Не допускать попадания в глаза. Внимательно прочтите инструкцию перед тем, как начать применение препарата. Сохраните инструкцию, она может понадобиться вновь. Если у вас возникли вопросы, обратитесь к врачу. Лекарственное средство, которым Вы лечитесь предназначено лично Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.