Инструкция по применению
Циндол Суспензия для наружного применения 125 г

Характеристики

Форма выпуска: Суспензия
Страна: Россия
Производитель: Усолье-Сибирский Химфармзавод
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Цинка оксид
Количество в упаковке: 1



Описание

Неоднородная взвесь с быстро выделяющимся после взбалтывания осадком белого или белого с сероватым оттенком цвета.

Действующее вещество

Цинка оксид

Состав

На 100 г: Активное вещество: цинка оксид - 12,5 г, Вспомогательные вещества: тальк - 12,5 г, крахмал картофельный - 12,5 г, глицерол - 20,0 г, этанол 70% - 20,0 г, вода очищенная - до 100,0 г.

Форма выпуска

Суспензия

Показания

Дерматиты язвы кожи опрелости. В случае необходимости пожалуйста проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Способ применения и дозы

Наружно. Перед применением взбалтывать. Тампоном смоченным препаратом наносят суспензию на пораженные участки кожи 2-3 раза в сутки. Если после лечения улучшение не наступает или появляются новые симптомы необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах которые указаны в инструкции. В случае необходимости пожалуйста проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно применение во время беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Возможны местные аллергические реакции: кожный зуд гиперемия сыпь. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки при наружном применении не описаны.

Взаимодействие с другими препаратами

Не изучалось.

Особые указания

Не допускать попадания в глаза. Внимательно прочтите инструкцию перед тем как начать применение препарата. Сохраните инструкцию она может понадобиться вновь. Если у Вас возникли вопросы обратитесь к врачу. Лекарственное средство которым Вы лечитесь предназначено лично Вам и его не следует передавать другим лицам поскольку оно может причинить вред даже при наличии тех же симптомов что и у Вас. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности требующих особого внимания и быстрых реакций (управление транспортом работа с движущимися механизмами).

Срок хранения после открытия

2 года. Не применять препарат по истечении срока годности указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.