Инструкция по применению
Циндол ИФФ Суспензия 125 мл

Характеристики



Форма выпуска: Суспензия
Страна: Россия
Производитель: Ивановская Фармацевтическая Фабрика
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Цинка оксид
Количество в упаковке: 1

Описание

Неоднородная взвесь с быстро выделяющимся после взбалтывания осадком белого или белого с сероватым оттенком цвета.

Действующее вещество

Цинка оксид

Состав

Активное вещество: Цинка оксид 12,5 г Вспомогательные вещества: Тальк медицинский 12,5 г Крахмал картофельный 12,5 г Глицерол 20,0 г Этанол (этиловый спирт) 70% 20,0 г Вода очищенная до 100 г

Форма выпуска

Суспензия

Показания

Дерматиты, язвы кожи, опрелости.

Способ применения и дозы

Применяют наружно. Перед применением взбалтывать. Тампоном, смоченным препаратом, наносят суспензию на пораженные участки кожи 2-3 раза в сутки.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к цинку оксиду и другим компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно применение во время беременности и период грудного вскармливания.

Побочные действия

Возможны местные аллергические реакции: кожный зуд, гиперемия, сыпь. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или отмечаются любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу.

Передозировка

В настоящее время о случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Не изучалось.

Особые указания

Не допускать попадания в глаза. Препарат предназначен только для наружного применения. Если симптомы заболевания не исчезают, следует обратиться к врачу. Суспензию не следует применять при наличии инфекции в местах поврежденной кожи. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Не влияет.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в местах, недоступных для детей.