Инструкция по применению
Циндол Суспензия для наружного применения 125 мл

Характеристики

Форма выпуска: Суспензия
Страна: Россия
Производитель: МОСКОВСКАЯ ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Цинка оксид
Количество в упаковке: 1



Описание

Неоднородная взвесь с быстро выделяющимся после взбалтывания осадком белого или белого с сероватым оттенком цвета.

Действующее вещество

Цинка оксид

Состав

Состав на 100 г Действующее вещество: Цинка оксид (Цинка окись) - 12,5 г Вспомогательные вещества: Тальк - 12,5 г Крахмал картофельный сорт "Экстра" или "Высший" - 12,5 г Глицерол (Глицерин) - 20,0 г Этанол (Спирт этиловый) 70 % - 20,0 г Вода очищенная до 100,0 г.

Форма выпуска

Суспензия

Показания

Дерматиты, язвы кожи, опрелости.

Способ применения и дозы

Наружно. Перед применением взбалтывать. Тампоном, смоченным препаратом, нанести суспензию на поражённые участки кожи 2-3 раза в сутки.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно применение во время беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Возможны местные аллергические реакции: кожный зуд, гиперемия, сыпь. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или вы заметили другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими препаратами

Не описано.

Особые указания

Не допускать попадания в глаза.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Применение препарата не влияет на управление транспортными средствами и занятие другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортом, работа с движущимися механизмами).

Условия хранения

При температуре не выше 25 С. Хранить в недоступном для детей месте.