Инструкция по применению
Цинкит Таблетки шипучие 10 мг 20 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Германия
Производитель: Вёрваг
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 20
Срок годности: 36

Описание

Биологически активная добавка к пище - дополнительный источник цинка. Цинк относится к незаменимым микроэлементам; принимает участие в таки х жизненно важных процессах, как стимуляция деления и рост клеток, обмен веществ и синтез белков, ускоряет заживление ран, наряду с кальцием необходим для формирования костей, отвечает за обоняние и вкусовое восприятие, а также оказывает значительное влияние на выработку мужских и женских половых гормонов, влияя тем самым на репродуктивную функцию и сексуальную активность.   Цинк также называют микроэлементом «красоты»: он активно участвует в процессе регенерации и обновления кожи; регулирует работу сальных желез, стимулирует синтез коллагена и кератина, влияя на рост волос и ногтей.   Недостаток цинка в рационе может привести к выпадению волос, появлению перхоти; ломкости и расслоению ногтей; сухости и шелушению кожи, медленному заживлению ран; потере аппетита; повышенной утомляемости, нервозности; нарушению восприятия вкуса и запаха.   Дополнительный прием цинка может быть рекомендован при нарушении всасывания цинка, например, при кишечных заболеваниях; усиленном выделении цинка при курении или злоупотреблении алкоголем; соблюдении строгой диеты или увлечении вегетарианством; при интенсивных занятиях спортом.

Состав

регуляторы кислотности: лимонная кислота (Е330) и натрия гидрокарбонат (Е500); цинка сульфат; подсластители: сорбит (Е420), натрия цикламат (Е952), натрия сахаринат (Е954); ароматизатор со вкусом маракуйи. содержание в 1 таблетке 10 мг цинка

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Для профилактики и устранения гипоцинкемии.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 таблетке 1 раз в день с приемом пищи, растворив в 200 мл воды. Продолжительность приема 1 месяц. При необходимости возможен повторный прием 2-3 раза в год.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов БАД. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Беременным и кормящим женщинам принимать по согласованию и под наблюдением врача.

Применение при беременности и кормлении грудью

В период беременности и лактации применять только после консультации с врачом.

Особые указания

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

В сухом месте