Инструкция по применению
Цинковая Мазь 10 % 25 г

Характеристики



Форма выпуска: Мазь
Страна: Россия
Производитель: Самарамедпром
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Цинка оксид
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 10%

Описание

Однородная масса белого или светло-желтого цвета.

Действующее вещество

Цинка оксид

Состав

Действующее вещество: цинка оксид - 10 г,вспомогательное вещество: вазелин - 90 г.

Форма выпуска

Мазь

Показания

Лечение и профилактика "пеленочной" сыпи у детей грудного возраста.В качестве средства первой помощи при легких повреждениях кожи (небольшие ожоги порезы царапины опрелости).Фотоконтактный дерматит.

Способ применения и дозы

Только для наружного применения."Пеленочная" сыпь у детей грудного возраста. Вымыть и высушили пораженную область. Нанести мазь тонким слоем на пораженные участки кожи 2-3 раза в день. Курс лечения - до 1 мес. Количество наносимой мази зависит от обширности очага поражения.Для профилактики "пеленочной" сыпи мазь наносят на кожу покрываемую пеленкой или подгузниками до начала появления признаков раздражения особенно перед сном когда ребенок может долгое время находиться в длительном контакте с мокрым бельем.Порезы царапины и ожогиНаносят тонким слоем при необходимости накладывают марлевую повязку. Наносят только на поверхностные и неинфицированные поражения.Фотоконтактный дерматитМазь наносят тонким слоем па пораженные участки кожи 4-6 раз в день предварительно обработав трещины и корочки антисептическим раствором.Если после лечения улучшение не наступает или симптомы усугубляются или появляются новые симптомы необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям тому способу применения и в тех дозах которые указаны в инструкции по применению.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно применение во время беременности и в период грудного вскармливания. Перед применением препарата если Вы беременны или предполагаете что Вы могли бы быть беременной или планируете беременность необходимо проконсультироваться с врачом.В период грудного вскармливания необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Аллергические реакции.Возможны реакции повышенной чувствительности к препарату: зуд гиперемия сыпь в местах нанесения мази.Если у Вас отмечаются побочные эффекты указанные в инструкции или они усугубляются или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции сообщите об этом врачу.

Передозировка

Нет сведений.

Взаимодействие с другими препаратами

Нет сведений.

Особые указания

Мазь не следует наносить при наличии инфекции на местах поврежденной кожи. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В сухом защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте.