Инструкция по применению
Циннабсин Таблетки 100 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Германия
Производитель: Альпен Фарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 100
Дозировка действующего вещества: 25 мг+25 мг+25 мг+25 мг
Срок годности: 48.0

Описание

Гомеопатическое средство

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

Cinnabaris D3 25 мгHydrastis D3 25 мгKalium bichromicum D3 25 мгEchinacea D1 25 мгВспомогательные вещества: лактоза, магния стеарат, крахмал пшеничный.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Фармакокинетика препарата Циннабсин не изучена.

Показания

В составе комплексной терапии острого и хронического воспаления придаточных пазух носа (гайморит, фронтит и др.).

Способ применения и дозы

При остром заболевании детям от 3 до 6 лет назначают по 1 таб. каждые 2 ч (не более 6 раз/сут) до наступления улучшения, далее - по 1/2 таб. 3 раза/сут до полного выздоровления.Детям от 6 до 12 лет лет назначают по 1 таб. каждый час (не более 7-8 раз/сут) до наступления улучшения, далее - по 1 таб. 2 раза/сут до полного выздоровления.Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1 таб. каждый час (не более 12 раз/сут) до наступления улучшения, далее - по 1-2 таб. 3 раза/сут до полного выздоровления.При хронических заболеваниях детям от 3 до 6 лет назначают по 1/2 таб. 3 раза/сут, детям от 6 до 12 лет - по 1 таб. 2 раза/сут, взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1 таб. 3 раза/сут до улучшения состояния.Курс лечения для профилактики рецидивов при хроническом течении заболеваний - до 2 мес.Таблетки следует принимать за 30 мин до или через 30 мин после приема пищи, медленно рассасывая во рту. Детям от 3 до 5 лет рекомендуется растворять таблетку в небольшом количестве жидкости или давать в измельченном виде под язык.

Противопоказания

повышенная чувствительность к компонентам препарата.Не рекомендуется назначать препарат детям в возрасте до 3 лет из-за недостаточности клинических данных.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата Циннабсин при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Побочные действия

Возможны: аллергические реакции, в единичных случаях - кожные реакции, при развитии которых препарат следует отменить.После применения препарата может наблюдаться повышенное слюноотделение (в этом случае следует уменьшить дозу или прекратить прием препарата).

Передозировка

В настоящее время о случаях передозировки препарата Циннабсин не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Лекарственное взаимодействие препарата Циннабсин с другими лекарственными средствами не установлено.

Особые указания

При применении Циннабсина возможно временное ухудшение состояния. В данном случае пациент должен прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.При применении Циннабсина допускается использование других лекарственных препаратов.Пациент должен быть информирован, что в случае отсутствия терапевтического эффекта в течение 3 дней препарат следует отменить и проконсультироваться с врачом.Прием препарата Циннабсин может оказывать отрицательное влияние на пациентов с целиакией и непереносимостью лактозы.

Условия хранения

В сухом месте