Инструкция по применению
Циннаризин Биосинтез Таблетки 25 мг 50 шт



Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Биосинтез
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Циннаризин
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 25 мг

Описание

Таблетки белого или белого с кремоватым оттенком цвета, двояковыпуклой формы.

Действующее вещество

Циннаризин

Состав

Активное вещество: циннаризин - 0,025 г. Вспомогательные вещества: сахар молочный, кальция стеарат, крахмал.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Метаболизм Циннаризина протекает полностью посредством дезалкилирования. Процесс метаболизма начинается через 30 минут после приема. Препарат резорбируется в желудке и кишечнике. Циннаризин достигает пиковых плазменных уровней от 1 до 3 часов после приема. Связь Циннаризина с белками плазмы составляет 91%. Период полувыведения равен 4 часам. Экскретируется в виде метаболитов: 1/3 с мочой и 2/3 с калом.

Показания

Ишемический инсульт, период долечивания геморрагического инсульта и черепно-мозговой травмы, дисциркуляторная энцефалопатия, лабиринтные расстройства (в т. ч. для поддерживающей терапии при головокружении, шуме в ушах, нистагме, тошноте, рвоте лабиринтного происхождения), мигрень (профилактика приступов), болезнь Меньера, морская и воздушная болезнь (профилактика), нарушение периферического кровообращения (профилактика и лечение) - облитерирующий атеросклероз, облитерирующий тромбангиит, болезнь Рейно, диабетическая ангиопатия, тромбофлебит, трофические нарушения, трофические и варикозные язвы, предгангренозные состояния, парестезии, ночные спазмы и похолодание в конечностях.

Способ применения и дозы

Внутрь, желательно после еды. При нарушениях мозгового кровообращения - по 25 - 50 мг (1 - 2 таблетки) три раза в день, при нарушении периферического кровообращения - по 50 - 75 мг (2 - 3 таблетки) три раза в день, при лабиринтных расстройствах - по 25 мг три раза в день, при морской и воздушной болезнях, перед предстоящей поездкой: взрослым - 25 мг, при необходимости, повторно через 6 часов. Детям дозу уменьшают вдвое. Максимальная суточная доза не должна превышать 225 мг. При высокой чувствительности к препарату лечение начинают с 1 /2 дозы, увеличивая ее постепенно. Курс лечения от нескольких недель до нескольких месяцев.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату, беременность, грудное вскармливание.

Побочные действия

Сонливость, утомляемость, головная боль, экстрапирамидные расстройства, депрессии, боль в эпигастральной области, сухость во рту, диспепсия, аллергические реакции (кожная сыпь), снижение АД, увеличение массы тела, волчаночно-подобный синдром, красный плоский лишай, потливость, холестатическая желтуха.

Передозировка

Симптомы: рвота, сонливость. Тремор, чрезмерное снижение АД, кома. Максимальная рекомендуемая доза не должна превышать 225 мг (9 таблеток) в день. В случае передозировки не существует специфического антидота, необходимо сделать промывание желудка и принять активированный уголь. Лечение - симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Фармацевтическое: химическая несовместимость не известна. Фармакодинамическое: усиливает действие алкоголя, седативных и антидепрессантных средств. При одновременном применении с ноотропными, антигипертензивными и сосудорасширяющими средствами усиливает их эффект, а при одновременном применении с препаратами, назначающимися при артериальной гипотензии - уменьшает их эффект. Фармакокинетическое: нет данных.

Особые указания

В начале лечения следует воздерживаться от потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенного внимания, а также не принимать этанол. В связи с наличием антигистаминного эффекта Циннаризин может повлиять на результат при антидопинговом контроле спортсменов (ложный положительный результат) и может нивелировать положительные реакции кожных диагностических проб (за 4 дня до исследования лечение следует отменить). При длительном применении рекомендуется проведение контрольного обследования функции печени, почек, картины периферической крови. Пациентам, страдающим болезнью Паркинсона, Циннаризин следует назначать только в тех случаях, когда преимущества от его назначения превышают возможный риск ухудшения состояния.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:В начале лечения следует воздерживаться от потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенного внимания.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте.