Инструкция по применению
Циннаризин-Реневал Таблетки 25 мг 56 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Обновление ПФК АО
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Циннаризин
Количество в упаковке: 56
Дозировка действующего вещества: 25 мг

Описание

Таблетки белого или белого с кремоватым оттенком цвета, плоскоцилиндрические с фаской, с маркировкой "R" на одной стороне или без нее.

Действующее вещество

Циннаризин

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Препарат всасывается в желудке и кишечнике. Максимальная концентрация в плазме крови после приема внутрь через 1-3 часа. Связь циннаризина с белками плазмы составляет 91 %. Полностью метаболизируется в печени (посредством дезалкилирования). Период полувыведения равен 4 часам. Выводится в виде метаболитов: 1/3 - почками и 2/3 - с каловыми массами - кишечником.

Показания

Симптомы цереброваскулярной недостаточности (головокружение, шум в ушах, головная боль, нарушение памяти, снижение концентрации внимания),вестибулярные нарушений (в т.ч. болезнь Меньера, головокружение, шум в ушах, нистагм, тошнота и рвота лабиринтного происхождения),профилактика кинетозов ("дорожной болезни" - морской и воздушной болезни),мигрень (профилактика приступов),нарушения периферического кровообращения: болезнь Рейно, "перемежающаяся" хромота, акроцианоз, трофические нарушения (в том числе трофические и варикозные язвы).

Способ применения и дозы

Внутрь, после еды.Взрослым: При недостаточности мозгового кровообращения, при вестибулярных нарушениях, для профилактики мигрени - по 25 мг три раза в сутки, При нарушениях периферического кровообращения - по 50-75 мг три раза в сутки, Для профилактики "дорожной болезни" - по 25 мг за полчаса перед дорогой (при необходимости повторный прием 25 мг через 6 часов).Максимальная суточная доза препарата не должна превышать 225 мг (9 таблеток) в день.Детям старше 5 лет - 1/2 дозы, рекомендуемой взрослым, по всем показаниям.Продолжительность курса лечения - от нескольких недель до нескольких месяцев. Для достижения оптимального терапевтического эффекта препарат следует принимать непрерывно. При высокой чувствительности к препарату лечение начинают с 1/2 дозы, увеличивая ее постепенно.

Противопоказания

Гиперчувствительность, беременность, период лактации.Непереносимость лактозы, лактазная недостаточность, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции.Дети до 5 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение препарата при беременности. На время приема препарата кормление грудью следует прекратить.

Побочные действия

Со стороны нервной системы: сонливость, утомляемость, головная боль, экстрапирамидные расстройства (тремор конечностей и повышение мышечного тонуса, гипокинезия|), депрессия.Со стороны пищеварительной системы: сухость во рту, боль в эпигастральной области, диспепсия, холестатическая желтуха.Со стороны кожных покровов: потливость, развитие волчаночноподобного синдрома, красный плоский лишай (крайне редко), кожная сыпь.Прочие: аллергические реакции, снижение артериального давления, увеличение массы тела.

Передозировка

Симптомы: рвота, сонливость, тремор, снижение артериального давления, кома. Лечение: специфического антидота не существует, промывание желудка, прием активированного угля, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Усиливает угнетающее действие на центральную нервную систему этанола, седативных средств, трициклических антидепрессантов.

Особые указания

Пациентам, страдающим болезнью Паркинсона, препарат следует назначать лишь в случае, когда преимущества лечения превосходят по значимости возможное ухудшение течения основного заболевания. В связи с антигистаминным эффектом назначение препарата следует прекратить за 4 дня до проведения аллергической кожной пробы.Препарат может повлиять на результат при антидопинговом контроле спортсменов (ложноположительный результат).Больным с непереносимостью лактозы, следует учитывать, что она входит в состав лекарственного препарата.При длительном применении рекомендуется проведение контрольного лабораторного исследования функции печени, почек, периферической крови.В период лечения препаратом следует воздержаться от приема алкоголя.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Возможно развитие сонливости, особенно в начале лечения, поэтому следует соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте.