
Инструкция по применению
Циннаризин Софарма Таблетки 25 мг 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Болгария
Производитель: ДОМИНАНТА-СЕРВИС
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Циннаризин
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 25 мг
Срок годности: 36.0



Действующее вещество

Циннаризин

Состав

Состав 1 таб. - циннаризин 25 мг. Вспомогательные вещества: крахмал пшеничный, лактозы моногидрат, поливинилпирролидон К25, аэросил 200, магния стеарат, целлюлоза микрокристаллическая. 50 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Всасывается сравнительно медленно в ЖКТ. Cmax в плазме крови достигается через 1-3 ч после перорального применения. Связывается с белками плазмы на 80%, с эритроцитами на 13%. Распределение в тканях более интенсивно в течение 4-х ч после приема. Полностью метаболизируется в печени, в основном путем N-дезалкилирования. Т1/2 составляет 3-6 ч, выводится в виде метаболитов: 1/3 - почками и 2/3 - с каловыми массами.

Показания

Взрослые и дети старше 12 лет: профилактика и лечение нарушений периферического кровообращения (облитерирующий эндартериит, облитерирутощий тромбангиит, болезнь Рейно, диабетическая ангиопатия, тромбофлебит, трофические нарушения (трофические и варикозные язвы), парестезии, ночные спазмы и похолодания в конечностях). Профилактика кинетозов (дорожной болезни, морской и воздушной болезни). Симптоматическое лечение лабиринтных и вестибулярных нарушений сосудистого происхождения, болезнь Меньера.

Способ применения и дозы

Взрослые и дети старше 12 лет: внутрь, с большим количеством жидкости, после еды. При нарушении периферического кровообращения - по 50-75 мг (2-3 таб/) 3 раза/сут. При высокой чувствительности к препарату лечение начинают с 1/2 дозы, увеличивая ее постепенно. Для достижения оптимального терапевтического эффекта, препарат следует принимать непрерывно, длительно - от нескольких недель до нескольких месяцев. При вестибулярных нарушениях - по 25 мг 3 раза/сут/ При кинетозе - по 25 мг за 30 мин перед предстоящей дорогой (при необходимости повторный прием 25 мг через 6-8 ч). При лабиринтных расстройствах - по 25 мг 3 раза/сут. Максимальная суточная доза не должна превышать 225 мг.

Противопоказания

беременность, период лактации, детский возраст до 12 лет, лактазная недостаточность, галактоземия или глюкозо-галактозный синдром мальабсорбции, целиакия (глютеновая энтеропатия), повышенная чувствительность к компонентам препарата. С осторожностью: болезнь паркинсона.

Применение при беременности и кормлении грудью

Ввиду отсутствия хорошо контролируемых клинических исследований в отношении безопасности применения у беременных женщин, не рекомендуется применение циннаризина во время беременности. В виду отсутствия данных в отношении экскреции в грудное молоко, применение циннаризина во время грудного вскармливания нежелательно. В случаях необходимости применения препарата, кормление фудью следует прекратить.

Побочные действия

Наиболее часто встречающиеся - сонливость, желудочно-кишечный дискомфорт, которые в большинстве случаев носят преходящий характер и проходят при уменьшении дозы. Другие реже встречающиеся, ,побочное действие: Со стороны сердечно-сосудистой системы снижение АД. Со стороны нервной системы: головная боль, повышенная утомляемость. У больных, принимающих циннаризин в высоких дозах продолжительное время, возможно появление эсктралирамидной симптоматики (тремор конечностей и повышение мышечного тонуса, гипокинезия, дезориентация, нарушение равновесия), включая синдром Паркинсона, депрессия. Со стороны пищеварительной системы: сухость во рту, боль в эпигастральной области, диспепсия. Крайне редко - холестатическая желтуха. Со стороны кожных покровов: повышенное потоотделение. В ,крайне редких случаях - красный плоский лишай и волчаночноподобные реакции. Аллергические реакции: ,кожная сыпь. Прочие: увеличение массы тела.

Передозировка

Симптомы: рвота, сонливость, снижение АД, тремор, кома. Лечение: в случаях передозировки - промывание желудка, активированный уголь. Применяются симптоматические средства. Специфического антидота не существует.

Взаимодействие с другими препаратами

Усиливает действие этанола (алкоголя) и седативных лекарственных средств. При одновременном применении с ноотропными, гипотензивными и сосудорасширяющими средствами усиливает их эффект. Уменьшает эффект гипертензивных лекарственных средств.

Особые указания

Циннаризин может вызвать желудочный дискомфорт. Прием таблеток после еды снижает раздражение слизистой оболочки желудка. Пациентам, страдающим болезнью Паркинсона, циннаризин следует назначать только в том случае, если его преимущества превышают возможный риск ухудшения состояния. Пациенты старше 65 лет, имеющие в семейном анамнезе или клинической симптоматике экстрапирамидные нарушения, должны находиться под постоянным медицинским контролем. У лиц, склонных к снижению АД (гипотонии), необходимо контролировать значения АД в ходе лечения. Циннаризин может вызвать ложно положительную реакцию при проведении антидопинговых тестов у спортсменов. При длительном применении рекомендуется проведение контрольного обследования функции печени, почек, картины переферической крови. Ввиду своих антигистаминных эффектов циннаризин может привести к ложным отрицательным результатам при кожных пробах на повышенную чувствительность. Лечение циннаризитюм следует отменить за 4 дня до исследований. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами: в ,период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении автотранспортом и занятиями потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении