Инструкция по применению
Цинокап Аэрозоль 0,2 % 58 г

Характеристики



Форма выпуска: Спрей
Страна: Россия
Производитель: Отисифарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Пиритион цинк
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 2 мг
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Пиритион цинк

Состав

Пиритион цинк 2 мг.Вспомогательные вещества: натрия лаурилсульфат, изопропилмиристат, кремния диоксид коллоидный (аэросил), декспантенол (D-пантенол), полисорбат 80 (твин 80), этанол (спирт этиловый ректификованный), тетрафторэтан (хладон 134а).

Форма выпуска

Спрей

Фармакокинетика

Системная абсорбция незначительная. Препарат обнаруживается в крови в следовых количествах.

Показания

— псориаз— атопический дерматит (экзема, нейродермит)— себорейный дерматит.

Способ применения и дозы

Препарат предназначен для наружного применения у взрослых и детей в возрасте 1 года и старше. Перед применением баллон встряхнуть. Распылять препарат на пораженный участок кожи с расстояния около 15 см в течение 3 сек, покрывая при этом поверхность, равную по площади ладони (что эквивалентно расходу 1 мл препарата). Пораженный участок обрабатывают 2-3 раза/сут до достижения клинического эффекта. Для обработки препаратом волосистой части головы прилагается дополнительная насадка. Применение препарата рекомендуется продолжить в течение 1 недели после исчезновения симптомов. Длительность лечения при псориазе составляет 1-1.5 мес, повторные курсы проводятся при появлении признаков обострения, при атопическом дерматите - 3-4 недели, при себорейном дерматите - 2 недели.

Противопоказания

— детский возраст до 1 года— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Условия хранения

В сухом месте