Инструкция по применению
Ципромед Капли ушные 0,3 % 10 мл

Характеристики

Форма выпуска: Капли
Страна: Индия
Производитель: Сентисс
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Ципрофлоксацин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0.3%



Описание

Ушные капли Ципромед 0,3% – препарат противомикробного действия.

Действующее вещество

Ципрофлоксацин

Состав

Ципрофлоксацин (в форме лактата) – 3 мг. Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид, молочная кислота, пропиленгликоль.

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

Исследования фармакокинетики препарата Ципромед не проводились в связи с низкой системной абсорбцией.

Показания

Лечение острых и хронических инфекционных заболеваний уха: наружный отит, острый и хронический средний отит. Профилактика инфекционных отитов до и после хирургических вмешательств, при травмах уха, извлечении инородного тела из наружного слухового прохода, сопровождающемся повреждением тканей уха.

Способ применения и дозы

Перед применением препарата следует провести санацию наружного слухового прохода (промыть и осушить слуховой проход). Препарат закапывают по 5 капель в наружный слуховой проход 3 раза/сут. Капли должны быть нагреты до температуры тела. После исчезновения симптомов заболевания следует продолжить лечение в течение 48 ч. После закапывания капель следует держать голову в запрокинутом положение в течение 2 мин. Можно поместить в наружный слуховой проход ватную турунду.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата или к другим хинолонам. Не рекомендуется к применению при беременности, в период лактации (грудного вскармливания), детям в возрасте до 15 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Ципромед не рекомендуется к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

В некоторых случаях возможно развитие аллергических реакций.

Передозировка

При применении ушных капель не отмечено случаев передозировки. При случайном приеме внутрь специфические симптомы отсутствуют, возможно - тошнота, рвота, диарея, головная боль, головокружение, чувство тревоги. Лечение: необходимо обеспечить достаточное поступление жидкости, поддержание кислой реакции мочи для предотвращения кристаллурии. При необходимости проводят симптоматическую терапию.

Взаимодействие с другими препаратами

Растовор ципрофлоксацина несовместим с лекарственными препаратами со значением pH=3-4, которые физически и химически нестабильны.