Инструкция по применению
Цистэль капсулы 550 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: ДЖИ ЭЛ ЭС ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 30
Срок годности: 3



Описание

Цистэль — инновационное комплексное средство для защиты от инфекций мочевыводящих путей. Действие Цистэль определяется активностью компонентов, входящих в его состав: D-маннозы и стандартизированного экстракта листьев Толокнянки. D-манноза оказывает антиадгезивное действие в отношении большинства инфекционных агентов, вызывающих цистит, включая E.coli, Klebsiella, Proteus, Enterococcus, Streptococcus. Большая часть D-маннозы, попадая в организм, выводится в неизменном виде с мочой и накапливается в мочевом пузыре. D-манноза препятствуя прикреплению бактерий к слизистой оболочке мочевого пузыря. Теряя способность прикрепляться к слизистой, бактерии выводятся с током мочи, прекращая свое негативное воздействие на организм. D-манноза не провоцирует кандидоз и дисбактериоз, не раздражает мочевыводящие пути. Не влияет на обменные процессы в организме, в том числе обмен сахаров. D-манноза включена в рекомендации Европейской Ассоциации Урологов (EAU), а также в Методические рекомендации департамента здравоохранения Москвы. Толокнянка обыкновенная – глубоко изученный уросептик, обладающий противомикробным, противовоспалительным, спазмолитическим, антиоксидантным и мочегонным действием.

Состав

В 2 капсулах (суточном приеме): D-манноза — 902 мг; Экстракт листьев толокнянки обыкновенной — 142 мг. Вспомогательные вещества: Носитель микрокристаллическая целлюлоза; Капсула (желатин, красители: азорубин, синий патентованный, замутнитель титана диоксид).

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище – источника арбутина. Средство для защиты от инфекций мочевыводящих путей.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема - 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано.

Побочные действия

 У пациентов, принимающих биологически активную добавку на основе экстракта листьев толокнянки, может наблюдаться развитие аллергической реакции, которая нередко сопровождается крапивницей, появлением отечности верхних дыхательных путей, кожной сыпью и покраснением. Чтобы исключить возникновение побочных эффектов следует соблюдать дозировку и назначение врача.

Передозировка

Случаев передозировки биологически активной добавкой не было зафиксировано. Однако согласно медицинским данным, превышение дозировки и длительный прием экстракта толокнянки может привести к тошноте, рвоте, диарее и обострению воспалительного заболевания мочевыводящих путей.

Взаимодействие с другими препаратами

Возможен совместный прием Цистеля с противовоспалительными лекарствами и антибиотиками. Однако перед началом курса терапии стоит проконсультироваться со своим лечащим врачом на предмет эффективности выбранной группы бактерицидного медикамента.

Особые указания

Пациентам с циститом и уретритом биодобавка назначается только после тщательного обследования и оценки ожидаемой пользы и возможного риска: не рекомендуется принимать капсулы Цистеля с препаратами, которые способствуют закислению мочи; возможно появление раздражения почечной паренхимы, поэтому с осторожностью стоит принимать при гломерулонефрите; препарат не вызывает сонливости и нарушения координации; не оказывает негативного воздействия на психомоторику человека во время управления транспортным средством или механизмами.

Условия хранения

Хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°С.