Инструкция по применению
Цистэль Пренатал Капсулы 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки жевательные
Страна: Россия
Производитель: ДЖИ ЭЛ ЭС ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 30



Описание

Цистэль пренатал эффективная защита мочевыводящих путей для беременных и кормящих матерей.О циститеЦистит — воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря.Чаще всего симптомами цистита становится учащенное мочеиспускание, боль во время мочеиспускания, рези, боль внизу живота, несдерживаемые позывы к мочеиспусканию.Цистит — одно из наиболее часто встречающихся заболеваний во время беременности.По статистике цистит возникает у 10 процентов беременных женщин.При кормлении грудью во время восстановления организма после родов риск заболеть циститом остается по прежнему высоким.Во время кормления грудью перечень препаратов, используемых для лечения строго ограничен.Наиболее часто цистит вызывает кишечная палочка (E.Coli).Причиной цистита в большинстве случаев являются бактерии, а именно кишечная палочка. По данным исследований, частота встречаемости Escherichia coli у беременных женщин с циститом составляет 86%. Наличие бактерий в моче во время беременности повышает риск развития цистита и осложнений.Перестройка гормонального фона беременной женщины снижаются защитные силы организма. Поэтому наличие бактерий в моче требует лечения (бессимптомная бактериурия).Цистит во время беременности может стать причиной серьезных осложнений.Инфекция в мочевом пузыре может не только причиной многих заболеваний у женщины (цистит, пиелонефрит), а также нанести вред плоду (преждевременные роды, низкая масса тела новорожденных, смерть плода).D-манноза.D-манноза — моносахарид, хорошо растворимый в воде, имеет сладкий вкус. В свободном виде обнаружена в плодах многих растений (цитрусовые, вересковые), а также грибов. Т.е. D-манноза есть во многих пищевых продуктах, разрешенных при

беременности, что так же доказывает ее безопасность.D-манноза не преобразуется в гликоген в печени, не влияет на углеводный обмен — возможен прием при сахарном диабете.Более 90% маннозы в неизменном виде выделяется с мочой — целенаправленное действие в мочевыводящих путях.D-манноза оказывает антиадгезивное действие в отношении большинства инфекционных агентов, вызывающих цистит. Большая часть D-маннозы, попадая в организм, выводится в неизменном виде с мочой и накапливаетсяв мочевом пузыре, препятствуя прикреплению бактерий к слизистой оболочке мочевого пузыря. Теряя способность прикрепляться к слизистой, бактерии выводятся с током мочи, прекращая свое негативное воздействие на организм.Магний.Магний является жизненно важным элементом, который находится во всех тканях организма и необходим для нормального функционирования клеток.Участвует в большинстве реакций обмена веществ, в регуляции передачи нервных импульсов и в сокращении мышц, оказывает спазмолитическое и антиагрегантное действие, также обладает литолитическим эффектом.Магний и цистит: Повышение pH Уменьшение раздражающего действия кислой среды Снижение болевых ощущений Нормализация регуляции нервно-мышечной передачиМагний оказывает успокаивающее действие на центральную нервную систему: Женщина испытывает болезненные ощущений Женщина переживает за свое здоровье и за здоровье будущего ребенкаМагний при беременности: Снижает повышенное артериальное давление (профилактика преэклампсии) Профилактика преждевременных родов, снижение тонуса матки Профилактика недоразвития нервной трубки плодаМеханизм действия1. Инфекционный агент ИМП — E.coli с помощью пилей прикрепляется к рецепторам на слизистой мочевого пузыря и вызывает ее воспаление.2. При приеме Цистэль Пернатал D-манноза поступает в мочевой пузырь и блокирует пили E.coli.3. E.coli теряет способность прикрепляться к слизистой мочевого пузыря.4. E.coli с током мочи полностью выводится из мочевого пузыря.Преимущества препарата Выводит инфекционный агент (E.coli), способствуя избавлению от инфекции и профилактики повторного рецидива. D-манноза включена в Европейские Клинические Рекомендации с 2015 года. В Российских Методических рекомендациях Департамента Здравоохранения — с 2017 года. Безопасность применения во время беременности и кормления грудью. Направленное действие на мочевыводящую систему. Не провоцирует кандидоз и дисбактериоз. Препарат может использоваться при бессимптомной бактериурии, без рисков побочных эффектов. Не вызывает устойчивость бактерий, не снижает эффективность терапии даже при длительном применении. Совместим с терапией другими средствами, применяемыми у беременных и кормящих женщин.

Состав

Глюкоза (декстроза), D-манноза, магния цитрат, стабилизатор полиэтиленгликоль, ароматизатор натуральный «вишня» (натуральные вкусоароматические вещества, мальтодекстрин, декстроза, стабилизатор гуммиарабик), L-лейцин.

Форма выпуска

Таблетки жевательные

Показания

В период профилактики и терапии инфекций мочевыводящих путей у беременных и кормящих женщин.

Способ применения и дозы

Внутрь. По две капсулы в день перед во время еды в течение 1 месяца. При необходимости курс приема можно повторить. Рекомендуется употребление 2–2,5 л жидкости в сутки.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов.Не является лекарством.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.