**Инструкция по применению**
**Цистон Таблетки 100 шт**

## Характеристики




Форма выпуска: Таблетки
Страна: Индия
Производитель: Хималайя
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Экстракты цветков двуплодника стебелькового+стеблей камнеломки язычковой+стеблей марены сердцелистной и др
Количество в упаковке: 100
Срок годности: 36.0

## Действующее вещество

Экстракты цветков двуплодника стебелькового+стеблей камнеломки язычковой+стеблей марены сердцелистной и др

## Состав

Действующее вещество: цветков двуплодника стебелькового (Didymocarpus pedicellata (Shilapuspha) 65 мг, стеблей камнеломки язычковой (Saxifraga ligulata (Pasanabheda) 49 мг, стеблей марены сердцелистной (Rubia cordifolia (Manjishtha) 16 мг, корневищ сыти пленчатой (Cyperus scariosus (Nagarmotha) 16 мг, семян соломоцвета шероховатого (Achyranthes aspera (Apamarga) 16 мг, надземной части оносмы прицветковой (Onosma bracteatum (Gojiha) 16 мг, целого растения вернонии пепельной (Vernonia cinerea (Sahadevi) 16 мг, порошок мумия очищенного (Asphaltum purified (Shilajeet) 13 мг, порошок силиката извести (Hajrul yahood bhasma) 16 мг

## Форма выпуска

Таблетки

## Фармакокинетика

Терапевтический эффект препарата Цистон обусловлен совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным.

**Показания**

В составе комплексной терапии: мочекаменной болезни; кристаллурии;инфекций мочевыводящих путей (циститы, пиелонефриты); подагры.

**Способ применения и дозы**

В комплексной терапии мочекаменной болезни препарат назначают по 2 таб. 2 раза /сут в течение 4-6 мес или до выхода камней.В комплексной терапии инфекций мочевыводящих путей препарат назначают по 2 таб. 2 раза/сут до ликвидации процесса.Для предотвращения рецидива после хирургического удаления или выхода камней - по 2 таб. 2 раза/сут в течение 1 мес, затем по 1 таб. 2 раза/сут в течение 4-5 мес.

**Противопоказания**

повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Не противопоказано применение у беременных при циститах.

**Побочные действия**

Возможны аллергические реакции.

**Передозировка**

Сведения о передозировке препарата Цистон отсутствуют.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Лекарственное взаимодействие препарата Цистон не описано.

**Особые указания**

Следует учитывать, что действие препарата Цистон развивается постепенно.Не рекомендуется применять препарат при острых болях в области мочевыводящих путей.В случае появления острых болей в процессе лечения следует прекратить прием препарата.

**Условия хранения**

В сухом месте