Инструкция по применению
Цитофлавин Таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 50 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Полисан
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Инозин+Никотинамид+Рибофлавин+Янтарная кислота
Количество в упаковке: 50
Срок годности: 24.0

Описание

Препарат ЦИТОФЛАВИН® содержит действующие вещества: Инозин + Никотинамид + Рибофлавин + Янтарная кислота. Препарат относится к фармакотерапевтической группе средств для лечения заболеваний нервной системы. Фармакологические эффекты обусловлены комплексным воздействием входящих в состав препарата ЦИТОФЛАВИН компонентов. Все действующие вещества препарата ЦИТОФЛАВИН® являются естественными метаболитами организма и стимулируют тканевое дыхание. Метаболическая энергокоррекция, антигипоксическая и антиоксидантная активность препарата, определяющие фармакологические свойства и лечебную эффективность составляющих, обусловлены взаимодополняющим действием янтарной кислоты, инозина, никотинамида и рибофлавина.

Действующее вещество

Инозин+Никотинамид+Рибофлавин+Янтарная кислота

Состав

Действующие вещества: Инозин+Никотинамид+Рибофлавин+Янтарная кислота. Каждая таблетка содержит: 0,300 г янтарной кислоты 0,050 г инозина 0,025 г никотинамида 0,005 г рибофлавина. Вспомогательные вещества, наличие которых необходимо учитывать в составе лекарственного препарата: пропиленгликоль (0,00291 г), краситель азорубин (кармуазин) (Е 122) (0,00007 г). Полный перечень вспомогательных веществ приведен в разделе 6.1.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

ЦИТОФЛАВИН обладает высокой биодоступностью. Янтарная кислота при приёме внутрь проникает из желудочно-кишечного тракта в кровь и ткани, участвуя в реакциях энергетического обмена, и полностью распадается до конечных продуктов обмена (двуокиси углерода и воды) через 30 минут. Инозин хорошо абсорбируется из желудочно-кишечного тракта. Время достижения максимальной концентрации в крови – 5 часов, среднее время удержания в крови – 5,5 часа, равновесный объём распределения около 20 литров. Инозин метаболизируется в печени с образованием инозинмонофосфата с последующим его окислением до мочевой кислоты. В незначительном количестве выводится почками. Никотинамид быстро распределяется во всех тканях (равновесный объём распределения около 500 литров). Время достижения максимальной концентрации в крови – 2 часа, среднее время удержания в крови – 4,5 часа. Никотинамид проникает через плаценту и в грудное молоко, метаболизируется в печени с образованием N-метилникотинамида, выводится почками. Рибофлавин быстро абсорбируется из желудочно-кишечного тракта, распределяется неравномерно (наибольшее количество в миокарде, печени, почках), трансформируется во флавинаденинмононуклеотид (ФМН) и флавинадениндинуклеотид (ФАД) в митохондриях. Проникает через плаценту и в грудное молоко выводится почками, преимущественно в виде метаболитов.

Показания

* последствий инфаркта мозга (инсульта) * других цереброваскулярных болезней (церебральный атеросклероз, гипертензивная энцефалопатия) * неврастении (повышенная раздражительность, утомляемость, утрата способности к длительному умственному и физическому напряжению) * диабетической полинейропатии * для профилактики когнитивных расстройств после обширных хирургических вмешательств у пациентов старше 60 лет.

Способ применения и дозы

Препарат принимают по 2 таблетки 2 раза в сутки с интервалом 8–10 часов. В комплексной терапии последствий инфаркта мозга, других цереброваскулярных болезней, неврастении продолжительность курса лечения составляет 25 дней. Рекомендовано повторение курса с интервалом 1 месяц. В комплексной терапии диабетической полинейропатии длительность применения составляет 75 дней. Применение препарата начинают на следующие сутки после окончания курса лечения препаратом «ЦИТОФЛАВИН раствор для внутривенного введения». Для профилактики когнитивных расстройств после обширных хирургических вмешательств у пациентов пожилого возраста препарат принимают в течение 25 дней. Применение препарата начинают на следующие сутки после окончания курса лечения препаратом «ЦИТОФЛАВИН раствор для внутривенного введения» (через 144 (+4) часа после начала операции).

Противопоказания

гиперчувствительность к действующим веществам или любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6.1 не рекомендуется к применению у детей до 18 лет в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности.

Применение при беременности и кормлении грудью

Фертильность Данные о влиянии препарата на фертильность человека отсутствуют. Беременность Безопасность применения препарата ЦИТОФЛАВИН у беременных женщин не изучалась, поэтому применение препарата при беременности не рекомендовано. Лактация Сведения о проникновении препарата ЦИТОФЛАВИН в грудное молоко человека отсутствуют, поэтому применение препарата в период грудного вскармливания не рекомендовано.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам, ЦИТОФЛАВИН® может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. Очень редко (не более чем у 1 человека из 10 000) могут возникать:

Срок хранения после открытия

3 года

Условия хранения

В сухом месте