Инструкция по применению
Цитовир-3 Капсулы 12 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Цитомед
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: альфа-глутамил-триптофан, аскорбиновая кислота, бендазол.
Количество в упаковке: 12
Дозировка действующего вещества: 0,5 мг+ 50 мг+ 20 мг
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

альфа-глутамил-триптофан, аскорбиновая кислота, бендазол.

Состав

Действующими веществами являются альфа-глутамил-триптофан + аскорбиновая кислота + бендазол. 1 капсула содержит: 0,5 мг альфа-глутамил-триптофан натрия, 50 мг аскорбиновой кислоты, 20 мг бендазола гидрохлорид.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

При приеме внутрь препарат полностью всасывается из ЖКТ. Биодоступность бендазола - около 80 %, альфа-глутамил-триптофана - не более 15 %, аскорбиновой кислоты - 90 %. Метаболиты бендазола и аскорбиновой кислоты выводятся с мочой. Альфа-глутамил-триптофан под воздействием пептидаз расщепляется на L - глутаминовую кислоту и L -триптофан, которые используются организмом в пептидном белка.

Показания

Цитовир®-3 показан к применению у взрослых и детей от 6 до 18 лет для профилактики и комплексной терапии гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 6 лет с целью профилактики и лечения внутрь по одной капсуле 3 раза в день за 30 мин до еды. Курс применения - 4 дня. Профилактический курс, при необходимости, повторяют через 3-4 недели.

Противопоказания

Не принимайте препарат Цитовир®-3, если у Вас: - аллергия на действующие вещества (альфа-глутамил-триптофан, аскорбиновая кислота, бендазол) или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка вкладыша); - беременность.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан к применению при беременности.В период грудного вскармливания применение возможно, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка.

Побочные действия

Аллергические реакции, кратковременное снижение артериального давления.

Передозировка

Симптомы: кратковременное снижение АД у пациентов с вегетососудистой дистонией, пожилого возраста.Лечение: контроль функции почек, АД и концентрации глюкозы в крови.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействие препарата Цитовир-3 с лекарственными средствами не выявлено.

Особые указания

Перед приёмом препарата Цитовир®-3 проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки, если у вас непереносимость некоторых сахаров.

Условия хранения

В сухом месте