Инструкция по применению
Цитралгин крем 50мл

Характеристики

Форма выпуска: Крем
Страна: Россия
Производитель: Амма
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24.0



Состав

Соли фруктовых кислот, диметикон (силикон), вазелин, ланолин, эмульгаторы (пентол), пчелиный воск, метилпарабен, пропилпарабен, отдушка, вода очищенная - 50 мл.

Форма выпуска

Крем

Способ применения и дозы

Дозировка и назначение. Крем \"Цитралгин\" наносят на неповрежденную кожу в области поражения в количестве 0,5-1,0 мл, слегка втирают или (для усиления эффекта) покрывают вощаной бумагой и оставляют до полного всасывания. Нанесение повторяют от 2 до 4 раз в сутки. Суточная доза крема составляет 2-8 мл. Курс лечения 10-14 дней. Затем поддерживающая доза может быть уменьшена до 0.5 мл в сутки. Рекомендуемые способы применения. 1 этап: \"Цитралгин\" 3-4 раза в день наносят на сухую кожу в области пораженного сустава, а так же на 10-15 см выше и ниже сустава и втирают до полного всасывания. При быстром всасывании нанесение повторяют, пока всасывание не прекратиться. Объем наносимого крема не менее 0,5-1,0 мл на один сустав. 2 этап: после массажа небольшое количество \" ЦИТРАЛГИНА\" дополнительно наносят на кожу, покрывают вощаной бумагой и оставляют до полного всасывания. Для рассасывания узелков Гебердена при деформирующем остеоартрозе и подагрических тофусов при подагре применяют массаж этих образований с применением крема \"ЦИТРАЛГИН\". Остеохондроз позвоночника с вторичным корешковым синдромом (радикулит). 1 этап: крем наносят вдоль позвоночника с обеих сторон от верхней части шеи до крестца, втирая его массирующими движениями. Это приводит к расслаблению мышц и уменьшению давления на корешки спинного мозга. Одновременно выявляются зоны наибольшей болезненности. Продолжительность 5-7 минут. 2 этап: нанесение и втирание крема в зоны наибольшей болезненности (3-5 минут), добиваясь максимального уменьшения болей. 3 этап: на зоны максимальной болезненности крем наносят дополнительно, не втирая, и оставляют под компрессной бумагой до полного всасывания. Нанесения повторяют 2-4 раза в день. Курс 10-20 дней. Повторение курса через 3-4 месяца. Рекомендуется сочетать применение \"ЦИТРАЛГИНА\" с мануальной терапией, физиотерапией, медикаментозным лечением.

Условия хранения

В сухом месте