Инструкция по применению
Цитралгин Крем 75 мл 1 шт

Характеристики

Форма выпуска: Крем
Страна: Россия
Производитель: Инфарма
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Механизм действия крема «Цитралгин». Основным механизмом действия «Цитралгина» являются нормализация нарушенных энергетических процессов в хрящевой и околосуставной ткани, восстановление функции тканевых ферментов, обеспечивающих подавление перекисного окисления липидов -одного из важных факторов развития воспалительного процесса. Способность входящего в состав крема цитрат иона связывать свободные ионы кальция приводит к нормализации показателей свертываемости крови и микроциркуляции. Эффект проявляется в уменьшении болезненной скованности, напряжения мышц, отека суставов, увеличении объема активных и пассивных движений, массаж с "Цитралином" помогает рассасыванию узелков в области мелких суставов кистей. Использование крема помогает уменьшить дозу нестероидных противовоспалительных средств. Применение крема сопровождается нормализацией показателей перекисного окисления липидов, показателей свертываемости крови и микроциркуляции.

Состав

вода очищенная, вазелин, масло растительное, цитрат натрия, пентол, глицерил олеат, эмульсионный воск, сорбитол, натрия глутамат, витамин Е, нипагин, нипазол. Aqua /Water,Vaseline, helianthus annuus (sunflower) seed oil, sodium citrate, pentol, glyceryl oleate, emylsifying wax, sorbitol, monosodium glutamate, tokopheryl acetate, methylparaben, propylparaben.

Форма выпуска

Крем

Показания

Крем для массажа при обменно-дистрофических и воспалительных заболеваниях суставов, болях в спине, мышцах. Для расслабляющего массажа после физических нагрузок. Для восстановительного массажа после травм, переломов. Во время лечебной физкультуры. Применяется в комплексном лечении таких заболеваний, как: Ревматоидный артрит. Ювенильный хронический артрит. Анкилозирующий спондилит, псориатическая артропатия, болезнь Рейтера. Подагрический артрит, инфекционный, ревматический артрит. Остеоартроз, остеохондроз позвоночника с вторичным корешковым синдромом. Шейный, грудной, пояснично-крестцовый радикулит, болезнь Бехтерева, миозит. Тромбофлебит глубоких и поверхностных вен, пост тромботическая болезнь. Облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей, диабетическая микроангиопатия.

Способ применения и дозы

Крем «Цитралгин» наносят на неповрежденную кожу болезненной области в достаточном количестве, втирают массирующими движениями до полного впитывания. Нанесение повторяют от 2 до 4 раз в сутки в течении 10-14 дней. Затем количество нанесений сокращают вдвое и продолжаю курс нанесений еще в течение 10 дней. Рекомендуется повторение курсов массажа. Для рассасывания узелков в области кистей рук применяют массаж этих образований с применением крема «ЦИТРАЛГИН». При массаже спины 1 этап: крем наносят вдоль позвоночника с обеих сторон от верхней части шеи до крестца, втирая его массирующими движениями. Это приводит к расслаблению мышц и уменьшению давления на корешки спинного мозга. Одновременно выявляются зоны наибольшей болезненности. Продолжительность 5-7 минут. 2 этап: нанесение и втирание крема в зоны наибольшей болезненности (3-5 минут), добиваясь максимального уменьшения скованности и болезненных ощущений. 3 этап: на зоны максимальной болезненности крем наносят дополнительно, не втирая, и оставляют под компрессной бумагой до полного впитывания. Курс 10-20 дней. Повторение курса через 3-4 месяца. Рекомендуется сочетать применение «ЦИТРАЛГИНА» с мануальной терапией, физиотерапией, медикаментозным лечением.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Возможно раздражение кожи при применении «ЦИТРАЛГИНА» в виде компрессов. В начале применения возможно усиление боли или отека, что связано с усилением кровоснабжения тканей. В этом случае временно уменьшают дозу наносимого крема.

Условия хранения

от 5# до 30#