Инструкция по применению
Далацин Крем вагинальный 2 % 20 г

Характеристики



Форма выпуска: Крем
Страна: Соединенные Штаты Америки
Производитель: Пфайзер
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Клиндамицин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 2%
Срок годности: 24

Действующее вещество

Клиндамицин

Состав

Порошок корней копеечника забытого, окись цинка, витамин Е.

Форма выпуска

Крем

Фармакокинетика

Всасывание;После интравагинального применения клиндамицина в дозе 100 мг/сут однократно в течение 7 дней Cmax клиндамицина в плазме крови достигается через 10 ч (4-24 ч) и составляет в 1-й день в среднем 18 нг/мл (4-47 нг/мл), а на 7-й день - 25 нг/мл (6-61 нг/мл), при этом системная абсорбция составляет около 4% (0.6-11%) от введенной дозы.; У женщин с бактериальными вагинозами при аналогичном режиме дозирования системной абсорбции подвергается около 4% клиндамицина (с меньшим разбросом 2-8%), Cmax достигается через 14 ч (4-24 ч) после введения и составляет в первый день в среднем 13 нг/мл (6-34 нг/мл), а на 7-й день - 16 нг/мл (7-26 нг/мл).; Системное воздействие клиндамицина при интравагинальном применении менее выражено, чем при введении внутрь или в/в.; Выведение;T1/2 составляет 1.5-2.6 ч. После повторного интравагинального введения клиндамицин почти не кумулирует.; Фармакокинетика у особых групп пациентов;В клинических исследованиях клиндамицина 2% крема вагинального участвовало недостаточное количество пациентов в возрасте 65 лет и старше, чтобы можно было оценить разницу в клиническом ответе на терапию между указанной возрастной группой и более молодыми пациентами. В имеющихся сообщениях из клинического опыта не было отмечено разницы в ответе пожилых пациентов и более молодых.

Показания

Применяется при заболеваниях: острый и хронический простатит, уретрит у мужчин и женщин, аденома предстательной железы, импотенция, туберкулез, бронхиты, бронхиальная астма, плевриты, пневмонии, патология молочной железы у женщин (мастопатия, новообразования), цистит, пиелонефрит, нефрит, анемия, эпилепсия, головные боли, герпес, маточные кровотечения.

Противопоказания

— антибиотик-ассоциированный колит в анамнезе; — возраст до 18 лет (данные по безопасности, эффективности отсутствуют); — повышенная чувствительность к клиндамицину, линкомицину или любому компоненту препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано при беременности и кормлении грудью.

Побочные действия

Аллергические реакции.

Особые указания

Противопоказано при индивидуальной непереносимости компонентов препарата, беременным и кормящим женщинам. Перед применением проконсультироваться с врачом.

Срок хранения после открытия

2

Условия хранения

При комнатной температуре