Инструкция по применению
Биолит Берестовый деготь 100 мл

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Биолит
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Деготь березовый
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 120



Описание

Берестовый деготь улучшает состояние кожи, при острых и хронических дерматозах, используется как естественный, природный репеллент против комаров, мошки и клещей. Действие Дёготь эффективен при возрастных изменениях структуры кожи, способствует разглаживанию морщин, повышению упругости и эластичности. Его применение показано в комплексной терапии при острых и хронических дерматозах. Ещё берестовый дёготь эффективно используется как природный репеллент благодаря выраженному специфическому запаху.

Действующее вещество

Деготь березовый

Состав

Деготь березовый содержит бетулин, ненасыщенные кислоты жирного ряда, ароматические и смоляные вещества.

Форма выпуска

Раствор

Показания

Деготь берестовый применяют в дерматокосметологии в качестве средства, обладающего кератопластическим, антисептическим, подсушивающим и противовоспалительным действием. Применение дегтя с целью профилактики и в составе комплексной терапии показано при острых и хронических дерматозах (эритеме, микробной экземе, нейродермите, атопическом дерматите, псориазе, себорее, пиодермиях, грибковых заболеваниях кожи, выпадении волос).

Способ применения и дозы

Наружно. При псориазе, экземе, нейродермите. 1-й способ использования: жидкость наносят тонким слоем на очаги поражения кожи 1–2 раза в день под повязку. 2-й способ использования: жидкость наносят на очаги поражения 1 раз в день, постепенно увеличивая время аппликации с 10 до 30 мин. По истечении этого времени препарат смывают с кожи теплой водой под душем с применением мыла или геля. Сухость кожи или ощущение стягивания устраняются применением смягчающих кремов или мазей. 3-й способ использования: 100–150 мл смеси со спиртом (1:1 или 1:2) используется для дегтярных ванн.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость, экзема в стадии обострения, при нарушениях функции почек.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте.