Инструкция по применению
Декарис Таблетки 150 мг 1 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Венгрия
Производитель: Гедеон Рихтер
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Левамизол
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 150 мг
Срок годности: 60

Действующее вещество

Левамизол

Состав

Действующее вещество: Левамизол. Концентрация действующего вещества (мг): 150 мг

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Левамизол при приеме внутрь в дозе 50 мг быстро всасывается из ЖКТ. Максимальная концентрация в плазме крови определяется, в среднем, через 1,5-2 часа после приема препарата. Левамизол подвергается интенсивному метаболизму в печени, основные его метаболиты - п-гидрокси-левамизол и его глюкуронид. Время полувыведения из организма составляет 3-6 часов. В неизмененном виде выделяется с мочой меньше, чем 5 %, с калом меньше, чем 0,2 % от введенной дозы.

Показания

Заражения гельминтами Ascaris lumbricoides, Necator Americanus и Ancylostoma duodenale.

Способ применения и дозы

Таблетки 50 мг: Детям от 3 до 6 лет (10-20 кг) - 25-50 мг(12-1 таблетка). от 6 до 10 лет (20-30 кг) 50-75 мг (1- 1, 5 таблетки). от 10 до 14 лет (30-40 кг) - 75-100 мг (1, 5-2 таблетки) однократно. Препарат целесообразно принимать после еды с небольшим количеством воды, вечером. В приеме слабительных или специальной диете нет необходимости. При необходимости прием препарата можно повторить через 7-14 дней. Таблетки 150 мг. Взрослым назначается однократно одна таблетка по 150 мг. Препарат целесообразно принимать после еды с небольшим количеством воды, вечером. В приеме слабительных или специальной диете нет необходимости. При необходимости прием препарата можно повторить через 7-14 дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к одному из компонентов препарата. агранулоцитоз, вызванный лекарственными средствами (в анамнезе). детский возраст до 3 лет. период лактации. Для таблеток 150 мг детский возраст является Противопоказаниям! Беременность Беременным препарат назначать только в том случае, если ожидаемая польза превосходит возможный риск применения препарата. Период лактации Для защиты новорожденного надо решить, прекратить ли кормление грудью или прекратить прием препарата, в зависимости от того, насколько необходимо принимать препарат для матери. Принимать с осторожностью при печеночной или почечной недостаточности, угнетении костномозгового кроветворения.

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременность. Беременным препарат назначать только в том случае, если ожидаемая польза превосходит возможный риск применения препарата. Период лактации. Для защиты новорожденного надо решить, прекратить ли кормление грудью или прекратить прием препарата, в зависимости от того, насколько необходимо принимать препарат для матери. Принимать с осторожностью при печеночной и/или почечной недостаточности, угнетении костномозгового кроветворения.

Побочные действия

Головная боль, бессонница, головокружение, ощущение сердцебиения, судороги, диспепсические явления, такие как тошнота, рвота, боли в животе, диарея. Имеются сообщения о развитии явлений со стороны ЦНС (энцефалопатии) через 2-5 недель после приема препарата, а также аллергические реакции (кожная сыпь), судороги. У большинства пациентов это явление было обратимым, и раннее применение глюкокортикостероидной терапии улучшала прогноз. Связь этих симптомов с приемом Декариса не вполне убедительна. При применении больших доз или при длительной терапии может наблюдаться лейкопения, агранулоцитоз, тремор

Передозировка

Симптомы: При введении большой дозы левамизола (свыше 600 мг) были описаны следующие признаки интоксикации: тошнота, рвота, сонливость, судороги, понос, головная боль, головокружение и спутанность сознания. Лечение: При случайной передозировке - если после приема препарата не прошло много времени - можно промыть желудок. Необходим мониторинг жизненных показателей и проведение симптоматической терапии. При наличии признаков антихолинэстеразного действия можно ввести атропин.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном приеме препарата со спиртными напитками наблюдаются дисульфирамоподобные явления. Требуется осторожность при применении Декариса с препаратами, влияющими на кроветворение. При одновременном приеме препарата с кумариноподобными антикоагулянтами протромбиновое время может удлиниться, поэтому необходимо скорректировать дозу перорального антикоагулянта. Декарис увеличивает уровень фенитоина в крови, поэтому при одновременном их применении необходимо контролировать уровень фенитоина в крови. Декарис нельзя одновременно применять с липофильными препаратами, такими как тетрахлорметан, тетрахлорэтилен, масло хеноподия, хлороформ или эфир, так как его токсичность может усилиться.

Особые указания

Во время и после приема препарата, в течение 24 часов нельзя употреблять спиртные напитки. Не доказано, что левамизол, применяемый в качестве антигельминтного средства, угнетает нервную систему.

Условия хранения

В сухом месте