Инструкция по применению
Декса-Гентамицин Капли глазные 5 мл

Характеристики

Форма выпуска: Капли
Страна: Германия
Производитель: Солко
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гентамицин+Дексаметазон
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1 мг+3 мг/1 мл
Срок годности: 36.0



Действующее вещество

Гентамицин+Дексаметазон

Состав

На 1 мл: дексаметазона натрия фосфат 1 мг, гентамицина сульфат 5 мг, что соответствует содержанию гентамицина 3 мг. Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид (консервант) - 0.05 мг, калия гидрофосфат - 1.88 мг, калия дигидрофосфат - 5.86 мг, натрия хлорид - 5 мг, вода д/и - до 1 мл.

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

При местном применении дексаметазон хорошо проникает в эпителий роговицы и конъюнктиву; при этом в водянистой влаге глаза достигаются терапевтичсекие концентрации; при воспалении или повреждении слизистой оболочки скорость пенетрации увеличивается.Гентамицина сульфат при местном применении обнаруживается в терапевтической концентрации в строме роговицы, во влаге передней камеры, стекловидном теле в течение 6 ч. Гентамицина сульфат не проникает в системный кровоток через неповрежденный эпителий роговицы

Показания

Инфекции переднего отрезка глаза, вызванные чувствительной к гентамицину микрофлорой (конъюнктивит, кератит, блефарит, ячмень);Аллергические процессы переднего отрезка глаза, сопровождающиеся бактериальным инфицированием; Профилактика и лечение воспалительных явлений в послеоперационном периоде (после удаления катаракты и проведения антиглаукомных операций)

Способ применения и дозы

Глазные капли Декса-Гентамицин закапывают в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 4-6 раз/сут.Полоску мази длиной 1 см закладывают в конъюнктивальный мешок 2-3 раза/сут. Во время аппликации глазной мази следует избегать контакта тюбика с поверхностью кожи или конъюнктивы.Длительность лечения Декса-Гентамицином обычно не превышает 2-3 недель. Продолжительность терапии определяется эффективностью препарата, выраженностью симптоматики и вероятностью развития побочных эффектов.При одновременном применении нескольких офтальмологических лекарственных средств рекомендуется закладывать Декса-Гентамицин в форме глазной мази не ранее чем через 15 мин после использования глазных капель.

Противопоказания

Кератит, вызванный вирусами Herpes simplex и Varicella zoster (древовидный кератит); Вирусные заболевания роговицы и конъюнктивы (в т.ч. при ветряной оспе);Грибковые заболевания глаз;Микобактериальные инфекции глаз;Острые гнойные заболевания глаз с поражением эпителия роговицы;Эпителиопатия роговицы;Ттравмы и язвенные поражения роговицы;Повышенное внутриглазное давление;I триместр беременности; Детский и подростковый возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности);Ношение контактных линз;Повышенная чувствительность к компонентам препарата.Во время применения препарата не рекомендуется пользоваться контактными линзами.

Применение при беременности и кормлении грудью

Адекватных и строго контролируемых клинических исследований безопасности применения препарата Декса-Гентамицин при беременности и в период лактации не проводилось. Во II и III триместрах беременности и в период грудного вскармливания препарат можно применять в том случае, когда предполагаемая польза терапии для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка. Противопоказан в I триместре беременности.

Побочные действия

Редко: аллергические реакции, ощущение жжения в глазу после применения препарата.Возможно: контактный дерматит, герпетический кератит, перфорация роговицы при наличии кератита, грибковая инфекция, усиление выраженности бактериальной инфекции роговицы, птоза, мидриаза. Применение после травм роговицы может приводить к замедлению ее заживления. При длительном применении - развитие вторичной глаукомы, стероидной катаракты.

Передозировка

При применении препарата Декса-Гентамицин передозировка маловероятна.

Взаимодействие с другими препаратами

При совместном применении с атропином, другими холинергическими препаратами, препаратами, вызывающими мидриаз возможно повышение внутриглазного давления. При местном применении гентамицин несовместим с амфотерицином В, гепарином, сульфадиазином, цефалотином и клоксациллином. Местное применение этих препаратов вместе с гентамицином может привести к отложению преципитатов в конъюнктивальной полости.

Особые указания

При длительности применения препарата более 2 недель, а также у пациентов с указанием в анамнезе на глаукому рекомендуется регулярно контролировать внутриглазное давление.Если использование контактных линз является необходимым, то их следует вынимать перед применением препарата Декса-Гентамицин в форме глазных капель и устанавливать вновь не ранее чем через 20 мин.Пациент должен быть проинформирован о том, что при возникновении побочных явлений следует немедленно прекратить лечение и обратиться к офтальмологу.Использование в педиатрииДо настоящего времени данные клинических исследований безопасности и эффективности применения препарата Декса-Гентамицин у детей отсутствуют. Применение препарата в педиатрии возможно, если ожидаемый терапевтический эффект превышает потенциальный риск развития побочных реакций.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиСразу после применения препарата Декса-Гентамицин может возникнуть кратковременное нарушение остроты зрения, приводящее к замедлению психомоторных реакций. Поэтому не рекомендуется применять препарат непосредственно перед работой с механизмами и вождением автотранспорта. В течение 30 мин после инстилляции необходимо воздерживаться от занятий, требующих повышенного внимания.

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении