Инструкция по применению
Декса-Гентамицин мазь глазная 2,5 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Швейцария
Производитель: Солко
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гентамицин+Дексаметазон
Количество в упаковке: 1



Описание

Белая с желтоватым оттенком полупрозрачная мазь.

Действующее вещество

Гентамицин+Дексаметазон

Состав

1 г мази глазной содержит: Активные компоненты: дексаметазон 0,3 мг, гентамицина сульфат 5,0 мг в пересчете на гентамицин 3,0 мг. Вспомогательные вещества: вазелин белый 775,98 мг, парафин жидкий 149,13 мг, ланолин 69,9 мг.

Форма выпуска

Мазь

Фармакокинетика

При местном применении дексаметазон хорошо проникает в эпителий роговицы и конъюнктиву, при этом, в водянистой влаге глаза достигаются терапевтические концентрации, при воспалении или повреждении слизистой оболочки скорость пенетрации увеличивается. Гентамицина сульфат при местном применении обнаруживается в терапевтической концентрации в строме роговицы, во влаге передней камеры, стекловидном теле в течение 6 ч. Гентамицина сульфат не проникает в системный кровоток через неповрежденный эпителий роговицы.

Показания

инфекции переднего отрезка глаза, вызванные чувствительной к гентамицину микрофлорой (конъюнктивит, кератит, блефарит, ячмень), аллергические процессы переднего отрезка глаза, сопровождающиеся бактериальным инфицированием, профилактика и лечение воспалительных явлений в послеоперационном периоде (удаление катаракты, антиглаукоматозные операции).

Способ применения и дозы

Полоска мази длиной 1 см закладывается 2-3 раза в день в конъюнктивальную полость. Во время аппликации глазной мази Декса-Гентамицин следует избегать контакта тюбика с поверхностью кожи или конъюнктивы. При одновременном применении нескольких глазных лекарственных средств рекомендуется закладывать Декса-Гентамицин глазную мазь не ранее чем через 15 минут после использования глазных капель. Длительность лечения Декса-Гентамицином обычно не превышает 2-3 недель.

Противопоказания

повышенная чувствительность к любому из компонентов данного препарата, кератит, вызванный herpes zoster (древовидный кератит), ветряная оспа и прочие вирусные заболевания роговицы и конъюнктивы, грибковые заболевания глаз, микобактериальные инфекции глаз, острые гнойные заболевания глаз с поражением роговичного эпителия, эпителиопатия роговицы, травмы и язвенные поражения роговицы, ношение контактных линз, повышенное внутриглазное давление, I триместр беременности, детский возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности).

Применение при беременности и кормлении грудью

До настоящего времени данные клинических испытаний относительно применения Декса-Гентамицина во время беременности, лактации, а также у детей отсутствуют. Однако препарат может применяться во II-III триместре беременности в том случае, если предполагаемая польза для матери превышает возможный риск для плода.

Побочные действия

В редких случаях после закладывания мази возможны аллергическая реакция и ощущение жжения. Длительное применение препарата может стать причиной возникновения вторичной глаукомы и стероидной катаракты, поэтому при применении препарата более 2-х недель, а также у пациентов, имеющих в анамнезе глаукому, рекомендуется регулярно контролировать внутриглазное давление. Возможно возникновение контактного дерматита, герпетического кератита, перфорации роговицы при наличии кератита, грибковой инфекции, усиление выраженности бактериальной инфекции роговицы, птоза, мидриаза. При применении после травм роговицы может приводить к замедлению ее заживления. В случае возникновения побочных эффектов следует прекратить пользоваться препаратом и как можно скорее обратиться к офтальмологу.

Передозировка

При местном применении препарата Декса-Гентамицин глазная мазь передозировка маловероятна.

Взаимодействие с другими препаратами

При совместном применении с атропином, другими холинергическими или мидриатическими препаратами возможно увеличение уровня внутриглазного давления. При местном применении Гентамицин несовместим с амфотерицином В, гепарином, сульфадиазином, цефалотином и клоксациллином. Местное применение этих препаратов вместе с гентамицином может привести к отложению преципитатов в конъюнктивальной полости.

Особые указания

Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех. Сразу после закладывания глазной мази Декса-Гентамицин может возникнуть кратковременное нарушение остроты зрения, приводящее к замедлению психических и физических реакций. Поэтому не рекомендуется применять препарат непосредственно перед работой с механизмами и вождением автотранспорта. В течение 30 мин после инстилляции необходимо воздерживаться от занятий, требующих повышенного внимания.

Срок хранения после открытия

4 недели.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в местах, недоступных для детей!