Инструкция по применению
Декспантенол Промомед Мазь 5 % 25 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Россия
Производитель: Промомед
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Декспантенол
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 5%
Срок годности: 24



Действующее вещество

Декспантенол

Состав

В 100 г мази содержится: Активное вещество: Декспантенол - 5,0 г,Вспомогательные вещества: вазелин - 25,0 г, ланолин безводный - 15,0 г, парафин жидкий (вазелиновое масло) - 10,0 г, воск эмульсионный - 3,0 г, метиловый спирт - 1,0 г, стеариловый спирт - 0,65 г, метилпарагидроксибензоат (нипагин) - 0,2 г, вода очищенная - 40,15 г.

Форма выпуска

Мазь

Фармакокинетика

Декспантенол быстро абсорбируется кожей (быстро впитывается) и превращается в пантотеновую кислоту.Связывается с белками плазмы крови (главным образом с альбумином и β-глобулином).

Показания

- сухость кожи;- раны и ожоги;- дерматиты, пролежни, опрелости, абсцессы, фурункулы после вскрытия и санации;- асептические послеоперационные раны, плохо приживающиеся кожные трансплантаты;- лечение и профилактика трещин и воспаления сосков молочной железы во время лактации;- уход за грудными детьми: профилактика и лечение опрелостей у грудных детей, активизация процесса заживления кожи при мелких повреждениях, эритемы от пеленок.Ожоги различного происхождения (в т.ч. солнечные); Царапины, ссадины, раны; пролежни; плохо заживающие кожные трансплантаты; Асептические послеоперационные раны; Воспалительные процессы на коже; дерматиты; фурункулы; трофические язвы нижних конечностей; уход за кожей вокруг трахеостом, гастростом и колостом. Лечение и профилактика последствий неблагоприятного воздействия на кожу факторов внешней среды (холода, ветра, сырости). У детей - пеленочный дерматит, царапины и незначительное раздражение после Воздействия солнца, ультрафиолетового и рентгеновского облучения; лечение и профилактика опрелостей. Трещины и воспаления сосков молочной железы у кормящих матерей. Применяется также для обработки и защиты сухой кожи как источник нейтральных жиров и декспантенола.

Способ применения и дозы

Наружно. Мазь наносят на пораженный участок кожи 1 или несколько раз в сутки по показаниям.Кормящим матерям смазывают мазью инфицированную поверхность соска после кормления грудью.Грудным детям препарат применяют после смены белья или водной процедуры.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно применение декспантенола при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) по показаниям.

Побочные действия

Побочные явления развиваются исключительно редко. Возможны незначительно выраженные аллергические реакции.

Передозировка

Декспантенол даже в высоких дозах хорошо переносится и не токсичен. Случаи гипервитаминоза неизвестны.

Взаимодействие с другими препаратами

При проведении дополнительной местной терапии интервал между применением дексопантенола и других препаратов должен составлять не менее 5 мин

Особые указания

С осторожностью применять у пациентов с хронической почечной недостаточностью.

Условия хранения

В сухом месте