Инструкция по применению
Декспантенол Мазь 5% 25 г

Характеристики



Форма выпуска: Мазь
Страна: Россия
Производитель: Биохимик
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Декспантенол
Количество в упаковке: 1

Описание

Однотонная мазь от белого с желтоватым оттенком до светло-желтого цвета, со специфическим запахом ланолина.

Действующее вещество

Декспантенол

Состав

На 100 г мази: действующее вещество: декспантенол - 5 г, вспомогательные вещества: вазелин - 38 г, парафин жидкий - 10 г, миндальное масло - 0,3 г, воск пчелиный (белый) - 2,7 г, ланолин безводный - 21 г, цетостеариловый спирт [цетиловый спирт 60 %, стеариловый спирт 40 %] (Ланетте 0) - 3 г, вода очищенная - 20 г.

Форма выпуска

Мазь

Фармакокинетика

При наружном применении быстро абсорбируется кожей и превращается в пантотеновую кислоту, связывается с белками плазмы (главным образом с бета-глобулином и альбумином). Концентрация ее в крови - 0.5-1 мг/л, в сыворотке крови - 100 мкг/л. Пантотеновая кислота не подвергается в организме метаболизму (кроме включения в Ко-А), выводится в неизмененном виде.

Показания

Нарушения целостности кожного покрова, вызванные механическими, химическими, температурными факторами или после хирургических вмешательств, ожоги различного происхождения, в т.ч. солнечные, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы, трещины и т.д.) царапины, ссадины, раны, пролежни, плохо заживающие кожные трансплантаты, асептические послеоперационные раны, При нарушении целостности кожных покровов: заживление ожогов (в т.ч. солнечных), мелких повреждений кожи (ссадины, порезы, трещины и пр.). Профилактика и лечение сухости кожи, в том числе и как последствие дерматитов различного генеза (проявляющихся шелушением, покраснением, раздражением, чувством стянутости), а также ежедневный уход за участками кожных покровов, подверженных наибольшему воздействию внешних факторов (лицо, руки). Для ухода за молочной железой в период лактации (трещины и покраснения сосков молочной железы), для ухода за грудными детьми и младенцами (опрелость, "пеленочный" дерматит). В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Способ применения и дозы

Наружно. Мазь наносят 2-4 раза в сутки (при необходимости чаще). Наносят тонким слоем на пораженный участок и слегка втирают. В случае нанесения на инфицированную поверхность кожи, ее следует предварительно обработать антисептиком. Кормящим матерям смазывать поверхность соска после каждого кормления грудью. Грудным детям наносят препарат после каждой смены белья или водной процедуры. Длительность применения препарата и возможность повторного курса лечения зависят от индивидуальных особенностей течения заболевания у пациентов и определяется достигнутым терапевтическим эффектом и переносимостью препарата. Если после лечения улучшения не наступает или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому компоненту препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат можно применять во время беременности и в период грудного вскармливания. Если препарат применяется для обработки трещин сосков в период грудного вскармливания, он должен быть смыт перед кормлением ребенка.

Побочные действия

Аллергические реакции. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

В настоящее время о случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Не изучалось.

Особые указания

При беременности и в период грудного вскармливания следует избегать применения препарата на обширных участках. Не наносить на мокнущие раны. Избегать попадания в глаза или на слизистые оболочки.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.