Инструкция по применению
Декспантенол-ТФФ 5 % Мазь 35 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Декспантенол
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 5%



Описание

Декспантенол ТТФ - мазь для наружного применения от белого с желтоватым оттенком до светло-желтого цвета, однородная, со специфическим запахом.

Действующее вещество

Декспантенол

Состав

Декспантенол, вазелин - 27 г, парафин жидкий - 10 г, ланолин - 17 г, холестерол - 0.5 г, изопропилмиристат - 3 г, метилпарагидроксибензоат - 0.07 г, пропилпарагидроксибензоат - 0.03 г, вода - 37.4 г.

Форма выпуска

Мазь

Показания

Для перорального и местного применения: воспалительные заболевания полости рта, носа, гортани, дыхательных путей (в т. ч. после тонзиллэктомии), слизистой оболочки желудка, парестезии при неврологических заболеваниях, лечение дефектов слизистой зева матки.Для парентерального применения: послеоперационная атония кишечника, паралитический илеус, недостаточность пантотеновой кислоты при синдроме мальабсорбции.Для наружного применения: раны и ожоги. дерматиты, абсцессы, фурункулы, пролежни, опрелости. лечение и профилактика трещин и воспаления сосков молочной железы во время лактации. уход за грудными детьми.

Способ применения и дозы

Внутрь взрослым - 200-400 мг/сут. Детям - 100-300 мг/сут. Парентерально (п/к, в/м, в /в) - 500 мг/сут.Декспантенол в виде пастилок для рассасывания применяют в дозе 200-600 мг/сут.Раствор для наружного применения применяют для полоскания рта и горла в неразбавленном или разбавленном (кипяченой водой в соотношении 1:1) виде. для ингаляций - в неразбавленном виде. для втирания в кожу головы - в неразбавленном или разбавленном (водой или спиртом в соотношении 1:3) виде.Мазь или крем наносят на пораженную поверхность кожи 1 раз/сут. на область соска молочной железы накладывают в виде компресса. при лечении дефектов слизистой оболочки зева матки - назначают один или несколько раз/сут.

Противопоказания

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно применение декспантенола при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) по показаниям.

Условия хранения

В сухом прохладном месте. Беречь от детей. Не подвергать воздействию прямого солнечного света. При комнатной температуре