Инструкция по применению
Делагил таблетки 250мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Венгрия
Производитель: Меда Фарма
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Хлорохин
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 250 мг
Срок годности: 60



Действующее вещество

Хлорохин

Состав

Хлорохин (в форме фосфата) 250 мг;Вспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный гидрофобный (аэросил R972), полиакриловая кислота (карбомер 934Р), магния стеарат, тальк, поливинилбутирал (мовиталь В30Т), крахмал кукурузный.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

После приема внутрь быстро и почти полностью всасывается из ЖКТ. Cmax в крови достигается через 2-6 ч. На 55% связывается с альбуминами плазмы. Быстро распространяется по органам и тканям организма (печень, почки, селезенка, легкие). Легко проникает через ГЭБ и плаценту. Метаболизируется в небольшом количестве (25%). Выводится почками (70% - в неизмененном виде) медленно. Т1/2 составляет1-2 мес. При почечной недостаточности может кумулировать.

Показания

— малярия (профилактика и лечение всех видов); — внекишечный амебиаз; — амебный абсцесс печени; — системная красная волчанка (хроническая и подострая формы); — ревматоидный артрит; — склеродермия; — фотодерматоз.

Способ применения и дозы

Внутрь, для профилактики малярии - по 0.5 г в первую неделю 2 раза, затем 1 раз всегда в один и тот же день недели.;Лечение малярии проводят по следующей схеме: 1 день однократно 1 г, через 6-8 ч - 0.5 г, на 2 и 3 день лечения - по 0.75 г ежедневно в один прием.;При амебиазе - по 0.5 г 3 раза/сут в течение 7 дней, затем - по 0.25 г 3 раза/сут в течение еще 7 дней, в дальнейшем - по 0.75 г 2 раза в неделю в течение 2-6 мес.;При ревматоидном артрите - по 0.5 г 2 раза/сут в течение 7 дней, затем - по 0.5 г ежедневно в течение 12 мес.;При системной красной волчанке - ежедневно, по 0.25-0.5 г.;При фотодерматозе - по 0.25 г ежедневно в течение недели, затем - по 0.5-0.75 г еженедельно.

Противопоказания

— гиперчувствительность; — печеночная недостаточность; — почечная недостаточность; — угнетение костномозгового кроветворения; — тяжелые нарушения ритма; — псориатический артрит; — нейтропения; — порфиринурия; — беременность; — лактация.;С осторожностью - дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, ретинопатия, эпилепсия.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, гастралгия.;Со стороны нервной системы: головокружение, головная боль, нарушения сна, психозы, эпилептические припадки.;Со стороны сердечно-сосудистой системы: поражение миокарда с изменениями на ЭКГ, снижение АД.;Со стороны органов чувств: при длительном применении - помутнение роговицы, поражение сетчатки, нарушение зрения, звон в ушах.;Аллергические реакции: дерматит, фотосенсибилизация.;Прочие: миалгия, лейкопения, изменение цвета кожи и волос.

Передозировка

Симптомы: рвота, нарушение сознания, расстройство зрения, судороги, коллапс, угнетение дыхательного центра, вплоть до смертельного исхода (в течение 2 ч с момента угнетения дыхания).;Лечение: вызов рвоты, промывание желудка, прием внутрь активированного угля в дозе, в 5 раз превышающей предполагаемую дозу хлорохина; перитонеальный диализ, плазмаферез.

Взаимодействие с другими препаратами

Совместное назначение с фенилбутазоном, препаратами золота, пеницилламином, цитостатиками, левамизолом увеличивает вероятность аплазии костного мозга и поражения кожи.;Антациды нарушают абсорбцию, циметидин повышает концентрацию препарата в крови.;Сочетание с другими противомалярийными препаратами может сопровождаться антагонистическим эффектом.;При сочетании с ГКС увеличивается риск развития миопатии и кардиомиопатии, с ингибиторами МАО - увеличивается риск развития нейротоксичности, с этанолом - гепатотоксичность, с сердечными гликозидами - нарастает гликозидная интоксикация.

Особые указания

Во время лечения необходимы систематические осмотры окулиста и проведение общих анализов крови.

Условия хранения

В сухом месте