Инструкция по применению
Делсия Таблетки покрытые пленочной оболочкой 21 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Индия
Производитель: Sun Pharmaceutical
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество:
Дроспиренон+Этинилэстрадиол
Количество в упаковке: 21
Дозировка действующего вещества: 3 мг+ 0,03 мг



Описание

Комбинированный гормональный контрацептив с антиминералкортикоидным и антиандрогенным действием

Действующее вещество

Дроспиренон+Этинилэстрадиол

Состав

Дроспиренон+Этинилэстрадиол (Drospirenone+Ethinylestradiol)

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Предупреждение нежелательной беременности

Способ применения и дозы

Таблетки Делсии принимают внутрь ежедневно в течение 28 дней без перерывов приблизительно в одно и то же время, запивая небольшим количеством воды, в порядке, указанном на блистерной упаковке. Прием таблеток из новой упаковки начинают на следующий день после приема последней таблетки из предыдущей упаковки. Кровотечение "отмены" обычно начинается спустя 2-3 дня после начала приема неактивных таблеток Делсии (последний ряд блистерной упаковки) и может еще не закончиться до начала приема таблеток из следующей упаковки.

Противопоказания

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано

Взаимодействие с другими препаратами

Прием препаратов, индуцирующих активность изоферментов системы цитохрома Р450, может привести к снижению концентрации половых гормонов в плазме крови, что в свою очередь, может привести к "прорывным" кровотечениям или снижению надежности контрацепции Делсией. К таким лекарственным средствам относятся: фенитоин, барбитураты, примидон, карбамазепин, рифампицин, рифабутин, бозентан и препараты для лечения ВИЧ (например, ритонавир, невирапин), возможно также окскарбазепин, топирамат, фелбамат, гризеофульвин и препараты, содержащие Зверобой продырявленный. Как правило, максимальная стимуляция активности изоферментов наблюдается в течение первых 10 дней с момента начала приема препарата, однако она может сохраняться как минимум 4 недели после прекращения лекарственной терапии.

Условия хранения

При комнатной температуре. Беречь от детей