Инструкция по применению
Де-Нол Таблетки покрытые оболочкой 120 мг 32 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: ЗиО-Здоровье
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Висмута трикалия дицитрат
Количество в упаковке: 32
Дозировка действующего вещества: 120 мг

Описание

Противоязвенный препарат Де-Нол оказывает гастропротекторное действие. Де-Нол применяют при различных заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишк

Действующее вещество

Висмута трикалия дицитрат

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения (в т. ч. ассоциированная с Helicobacter pylori). хронический гастрит и гастродуоденит в фазе обострения (в т. ч. ассоциированный с Helicobacter pylori). синдром раздраженного кишечника, протекающий преимущественно с симптомами диареи. функциональная диспепсия, не связанная с органическими заболеваниями ЖКТ.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 4 лет - внутрь 2-4 раза/сут за 30 мин до приема пищи. Доза зависит от возраста пациента. Курс лечения - 4-8 недель. В течение следующих 8 недель не следует принимать препараты, содержащие висмут. Для эрадикации Helicobacter pylori целесообразно применение висмута трикалия дицитрата в комбинации с антибактериальными препаратами, обладающими антихеликобактерной активностью.

Противопоказания

Выраженное нарушение функции почек, беременность, период лактации, повышенная чувствительность к висмута трикалия дицитрату.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: возможны транзиторные эффекты - тошнота, рвота, учащение стула, запор. Дерматологические реакции: кожная сыпь, зуд. Со стороны ЦНС: при длительном применении в высоких дозах - энцефалопатия, связанная с накоплением висмута в ЦНС.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном приеме других лекарственных средств, а также пищи и жидкости, в частности, антацидов, молока, фруктов и фруктовых соков возможно изменение эффективности висмута трикалия дицитрата.