Инструкция по применению
Дентамет Гель стоматологический 25 г

Характеристики

Форма выпуска: Гель
Страна: Россия
Производитель: Алтайвитамины
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Метронидазол+Хлоргексидин
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24.0



Описание

Эффективность препарата обусловлена наличием в его составе двух антибактериальных компонентов: а) метронидазол обладает антибактериальным действием против анаэробных бактерий, вызывающих заболевания пародонта: Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Fusobacterium fusiformis, Wolinella recta, Eikenella corrodens, Borellia vincenti, Bacteroides melaninogenicus, Selenomonas spp.; б) хлоргексидин – антисептик широкого спектра, обладающий бактерицидным действием в отношении вегетативных форм грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, а также дрожжей, дерматитов и липофильных вирусов. При местном применении гель Дентамет практически не всасывается.

Действующее вещество

Метронидазол+Хлоргексидин

Состав

100 г препарата содержат: Действующих веществ: Метронидазола - 1,00 г Хлоргексидина (хлоргексидина биглюконата раствор 20 %) - 0,50 г Вспомогательных веществ: Левоментола (L-Ментол) - 0,25 г Глицерола (глицерин дистиллированный) - 5,00 г Пропиленгликоля - 5,00 г Троламина (триэтаноламин термостабильный) - 0,47 г Карбомера - 1,25 г Натрия сахарината дигидрата - 0,25 г Воды очищенной - 86,28 г

Форма выпуска

Гель

Показания

Инфекционно-воспалительные заболевания пародонта и слизистой оболочки полости рта: острый и хронический гингивит (воспаление десен); острый язвенно-некротический язвенный гингивит Винцента; хронический отечный гингивит, хронический гиперпластический гингивит, хронический атрофический (десквамативный) гингивит; острый и хронический пародонтит; пародонтоз, осложненный воспалением; язвенный, афтозный стоматит; гангренозный пульпит; хейлит; воспаления слизистой оболочки полости рта при ношении протезов; воспаления лунки после удаления зуба; зубная боль инфекционного происхождения; периодонтит, периодонтальный абсцесс (в составе комплексной терапии); постэкстракционный альвеолит, юношеский пародонтит.

Способ применения и дозы

Только для стоматологического применения! Взрослым и детям старше 6 лет – при воспалении десен (гингивит). Наносится на область десен 2 раза в день. Не смывать, воздерживаться от питья, еды, чистки зубов. Длительность курса лечения – 7-10 дней. Не заменяет чистку зубов. Профилактические курсы лечения проводятся в течение 2-4 нед. 1-2 раза в год.

Противопоказания

Повышенная чувствительность, индивидуальная непереносимость компонентов Заболевания системы крови Заболевания периферической и центральной нервной системы Детский возраст до 18 лет

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется назначать препарат беременным женщинам в I триместре беременности. В период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Побочные действия

"Металлический" привкус во рту, головная боль, аллергические реакции (кожная сыпь, зуд, крапивница).

Передозировка

Случаев передозировки препарата при местном применении не наблюдалось.

Взаимодействие с другими препаратами

При местном применении в рекомендованных дозах системного взаимодействия геля Дентамет с другими лекарственными средствами не выявлено.

Особые указания

Применение геля Дентамет не заменяет гигиенической чистки зубов, поэтому во время курса лечения препаратом чистка должна быть продолжена.

Условия хранения

Не допускать замерзания