Инструкция по применению
Дентинокс Гель стоматологический 10 г

Характеристики



Форма выпуска: Гель
Страна: Германия
Производитель: ДЕНТИНОКС
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Лауромакрогол-600+Лидокаин+Ромашки аптечной цветков экстракт
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 60.0

Действующее вещество

Лауромакрогол-600+Лидокаин+Ромашки аптечной цветков экстракт

Состав

Действующее вещество: Полидоканол 600 – 3, 2 мг, Лидокаин (в форме гидрохлорида) – 3, 4 мг. Ромашки настой – 150 мг. Вспомогательные вещества: ксилит, сорбит, пропиленгликоль, эдетат натрия, полисорбат 20, карбомер, сахарин натрия, гидроксид натрия, ментол, очищенная вода. Концентрация действующего вещества (мг): 156, 6 мг

Форма выпуска

Гель

Фармакокинетика

Каберголин быстро всасывается из ЖКТ, Cmax в плазме достигаетсячерез 0,5–4 ч, связь с белками плазмы крови составляет 41–42%.T1/2 каберголина, оцениваемый по скорости выведения почками,составляет 63–68 ч у здоровых добровольцев и 79–115 ч у пациенток сгиперпролактинемией. Вследствие длительного T1/2, Css достигаетсячерез 4 нед. Через 10 дней после приема препарата в моче и калеобнаруживаются соответственно около 18 и 72% от принятой дозы, причемдоля неизмененного препарата в моче составляет 2–3%. Основнымпродуктом метаболизма каберголина, идентифицированным в моче,является 6-аллил-8β-карбокси-эрголин в концентрации до4–6% отпринятой дозы. Содержание в моче 3 дополнительныхметаболитов непревышает 3% от принятой дозы. Установлено, что продуктыметаболизмаобладают значительно меньшим эффектом в отношенииподавлениясекреции пролактина по сравнению с каберголином. Прием пищине влияет навсасывание и распределение каберголина.

Показания

Гель применяют наружно для облегчения боли и неприятных ощущений при прорезывании зубов. Гель может применяться как для снятия острой боли и воспаления, так и для профилактики.

Способ применения и дозы

Средство наносят на десну в районе режущегося зуба. За один раз следует использовать количество геля размером не более горошины. Нанесение средства рекомендуется проводить ватной палочкой или чистым пальцем. Гель следует аккуратно втирать в десну. Частота применения геля – несколько раз в сутки. Препарат разрешено применять при появлении всех коренных и молочных зубов.

Противопоказания

Абсолютным Противопоказаниям к применению геля Дентинокс является непереносимость действующих и дополнительных веществ.

Применение при беременности и кормлении грудью

Так как данное лекарственное средство используется исключительно для облегчения болей при первом прорезывании зубов у детей, сведений по применению данного препарата в период беременности и лактации нет.

Побочные действия

Гель в большинстве случаев не вызывает побочных эффектов и неплохо переносится пациентами. Лишь в единичных случаях применение геля приводит к развитию местных аллергических реакций, включая покраснение, сыпь и зуд. Гель не вызывает развития кариеса, так как содержит заменители сахара.

Передозировка

Благодаря низкой дозировке активного вещества, а также небольшому объему упаковки (10 г), симптомы, характерные в случаях передозировки, никогда не наблюдались. На настоящий момент не сообщалось ни об одном случае интоксикации.

Взаимодействие с другими препаратами

Информация о взаимодействии каберголина и других алкалоидов спорыньи отсутствует, поэтому одновременное применение этих ЛС во время длительной терапии препаратом Достинекс не рекомендуется. Поскольку каберголин оказывает терапевтическое действие путем прямой стимуляции дофаминовых рецепторов, его нельзя назначать одновременно с препаратами, действующими как антагонисты дофамина (фенотиазины, бутирофеноны, тиоксантены, метоклопрамид и др.), т. к. они могут ослабить действие каберголина, направленное на снижение концентрации пролактина. Как и другие производные спорыньи, каберголин нельзя применять одновременно с антибиотиками-макролидами (например эритромицином), т. к. это может привести к увеличению системной биодоступности каберголина.

Особые указания

Не вызывает аллергических реакций.

Условия хранения

В сухом месте