Инструкция по применению
Дентокинд Таблетки для рассасывания 150 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Германия
Производитель: Альпен Фарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 50
Срок годности: 60.0

Описание

Гомеопатическое средство

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

1 таблетка содержит:Belladonna (белладонна) D6 15 мгChamomilla recutita (Chamomilla) (хамомилла рекутита (хамомилла)) D6 15 мгFerrum phosphoricum (феррум фосфорикум) D6 15 мгHepar sulfuris (гепар сульфурис) D12 15 мгPulsatilla pratensis (пульсатилла пратенсис) D6 15 мгВспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая - 15 мг, лактозы моногидрат - 4.8 мг, тальк - 5 мг, магния стеарат - 0.2 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Дентокинд не предоставлены.

Показания

— лечение болезненных симптомов при прорезывании молочных зубов у детей, таких как болезненная чувствительность, припухлость и воспаление десен, беспокойство и раздражительность, лихорадка, отталгия, диарея.

Способ применения и дозы

Таблетки следует принимать внутрь за 30 мин до еды или через 40 мин после еды, медленно рассасывая их в полости рта. При лечении грудных детей и детей в возрасте до 3 лет таблетки необходимо растворить в небольшом количестве воды (1 чайная ложка).При отсутствии иных указаний Дентокинд следует принимать следующим образом: детям в возрасте до 3 лет при острых симптомах - по 1 таб. через каждый час (но не более 6 таб./сут), после ослабления симптомов - по 1 таб. 3 раза/сут, детям в возрасте от 3 до 6 лет при острых симптомах - по 2 таб. через каждый час (но не более 12 таб./сут), после ослабления симптомов - по 2 таб. 3 раза /сут.Длительность лечения - до 7 дней. При необходимости возможно проведение повторного курса.

Противопоказания

— дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция,— повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата.

Побочные действия

Возможно: аллергические реакции.До настоящего времени информация о случаях возникновения побочных эффектов не поступала. При возникновении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Передозировка

В настоящее время о случаях передозировки препарата не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

На настоящий момент информация о взаимодействии препарата Дентокинд с другими лекарственными средствами отсутствует.Если ребенок принимает или принимал в недавнем прошлом другие лекарственные препараты, в т.ч. те, которые можно приобрести без рецепта, следует сообщить об этом врачу.

Особые указания

При применении гомеопатических лекарственных препаратов возможно возникновение временного первичного ухудшения состояния. В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.При отсутствии улучшения состояния ребенка на фоне применения препарата в течение первых 2 сут и/или повышении температуры тела выше 38°С необходимо обратиться к врачу. Максимальная суточная доза при острых симптомах составляет 12 таблеток, что соответствует 0.1 ХЕ.

Условия хранения

В сухом темном месте