
Инструкция по применению
Д-пантенол-Нижфарм-плюс крем для наружного применения туба 30 г

Характеристики



Форма выпуска: Крем
Страна: Россия
Производитель: Нижфарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Декспантенол+Хлоргексидин
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24

Действующее вещество

Декспантенол+Хлоргексидин

Состав

1г крема содержит: действующие вещества: декспантенол — 52,5 мг, хлоргексидина биглюконат — 8,02 мг (в виде хлоргексидина биглюканата раствора 20 % — 42,7 мг), вспомогательные вещества-, пропиленгликоль — 100 мг, макрогола цетостеарат — 16 мг, цетостеариловый спирт [цетиловый спирт не более 60 %, стеариловый спирт не менее 40 %] — 54 мг, парафин жидкий — 100 мг, вазелин — 100 мг, натрия гидрофосфата додекагидрат — 0,2 мг, калия дигидрофосфат — 7,8 мг, вода — до 1 г.

Форма выпуска

Крем

Показания

Лечение и профилактика инфицированных повреждений кожи: для обработки ран при опасности инфицирования (ссадин, порезов, царапин, трещин, расчесов, в том числе после укусов насекомых, ожогов, трофических язв), для обработки послеоперационных ран, для лечения инфицированных ран, ожогов (в том числе солнечных), пролежней, ссадин, порезов, трещин, трофических язв, опрелостей, для лечения инфицированных дерматозов (в том числе экземы и атопического дерматита). У детей также применяют при пеленочном дерматите, царапинах с признаками инфицирования. У кормящих матерей — при трещинах и воспалении сосков молочных желез с признаками инфицирования.

Способ применения и дозы

Наружно. Крем наносят тонким слоем на пораженный участок кожи один или несколько раз в сутки по показаниям. Кормящим матерям смазывать кремом инфицированную поверхность соска после кормления грудью. Грудным детям наносят на места инфицирования после смены белья или водной процедуры.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. Взаимодействие Хлоргексидин не совместим с мылом и другими анионными веществами.

Особые указания

Не допускать попадания в глаза. При беременности и лактации следует избегать применения на обширных участках.

Условия хранения

В сухом месте