Инструкция по применению
Депантол Суппозитории вагинальные 100 мг + 16 мг 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Суппозитории
Страна: Россия
Производитель: Нижфарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Декспантенол+Хлоргексидин
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 100 мг+ 16 мг
Срок годности: 24

Описание

Суппозитории торпедообразной формы белого или белого с сероватым или желтоватым оттенком цвета. допускается мраморность и наличие на срезе воздушного стержня и воронкообразного углубления.

Действующее вещество

Декспантенол+Хлоргексидин

Состав

Один суппозиторий содержит: действующие вещества: декспантенол – 100 мг, хлоргексидина биглюконата раствор 20 % - 85,2 мг (в пересчете на хлоргексидина биглюконат – 16 мг), вспомогательные вещества: смесь макроголов (макрогол 400 – 2 %, макрогол 1500 – 98 %).

Форма выпуска

Суппозитории

Показания

Лечение острых и хронических вагинитов, бактериального вагиноза, эндо-/экзоцервицитов. Лечение истинных эрозий шейки матки специфической этиологии (в составе комплексной терапии). Профилактика инфекционно-воспалительных осложнений в акушерстве и гинекологии: перед оперативным лечением гинекологических заболеваний, родоразрешением, медицинским прерыванием беременности, внутриматочными обследованиями (в т. ч. гистероскопии, гистеросальпингографии), перед установкой внутриматочного контрацептива. Препарат применяется для улучшения регенерации слизистой оболочки влагалища и шейки матки после деструктирующих методов лечения (диатермокоагуляции, криодеструкции, лазеродеструкции), в послеоперационном, послеродовом периодах.

Способ применения и дозы

Применяют интравагинально. Перед применением суппозиторий освобождают от контурной упаковки. Вводить по 1 суппозиторию 2 раза в сутки, в течение 7—10 дней. При необходимости возможно продление курса лечения до 20 дней. Если после лечения улучшения не наступает, или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции (сыпь, зуд), жжение.

Передозировка

Случаи передозировки неизвестны. При применении препарата в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна.

Взаимодействие с другими препаратами

В качестве меры предосторожности относительно возможного взаимодействия (антагонизм или инактивация), не следует применять одновременно с другими антисептиками, вводимыми интравагинально. Депантол® не совместим с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза) и мылами, если они вводятся интравагинально. Не рекомендуется одновременное применение с йодсодержащими препаратами, используемыми интравагинально. Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата Депантол® проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

При появлении побочных эффектов следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу. В период лечения рекомендуется воздерживаться от половых контактов. До и после применения препарата следует вымыть руки.

Условия хранения

Беречь от детей