Инструкция по применению
Депетра Таблетки шипучие 3,8 г 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки шипучие
Страна: Россия
Производитель: Эвалар
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Входящие в состав биологически активной добавки Депетра растительные компоненты и арбутин способствуют укреплению иммунитета и улучшению общего состояния организма, поддержанию здоровья мочевыводящих путей, снижая риск обострения хронических инфекций (препятствуют образованию и отложению солей, размножению бактерий на поверхности слизистой мочевыводящих путей, способствуют выведению патогенных штаммов бактерий), в дополнение при комплексной терапии инфекций мочевыводящих путей.Экстракт травы десмодиума стираксолистного (Desmodium Styracifolium) 1200-1800 мг/сут много лет применяется в традиционной медицине при мочекаменной болезни, в т.ч. для облегчения кристалл-индуцированного повреждения почек.Экстракт корня лопуха 900-1350 мг/сут содержит слизи, эфирное масло, жирное масло, состоящее из пальмитиновой и стеариновой кислот, а также инулин, дубильные и горькие вещества, минеральные соли, витамины. Оказывает диуретическое, умеренное противовоспалительное действие и улучшает минеральный обмен.Экстракт травы хвоща полевого 120-180 мг /сут содержит кремниевую кислоту, дубильные вещества, сапонины, флавоноиды, алкалоиды, органические кислоты. Активные вещества оказывают диуретическое и противовоспалительное действие. Применяется при бактериальных и воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей, камнях в почках и мочевом пузыре.Экстракт листьев брусники 100-150 мг/сут (арбутин 8-12 мг/сут) содержит фенологликозиды (арбутин, метиларбутин и др.), дубильные вещества. Оказывает противомикробное, противовоспалительное, антиоксидантное, диуретическое и деминерализующее действие. Стимулирует фагоцитоз, повышает эффективность лечения антибиотиками. Применяют в составе комплексной терапии инфекций мочевых путей (пиелонефрит и др.) и нефроуролитиазе.Лимонная кислота, натрия гидрокарбонат и цитрат натрия влияют на кислотность мочи, тем самым создают неблагоприятные условия для существования патогенных микроорганизмов.

Состав

Таблетки шипучие массой 3.8 г.4-6 таблеток содержатэкстракт травы десмодиума стираксолистного (Desmodium Styracifolium) - 1200-1800 мгэкстракт корня лопуха - 900-1350 мгэкстракт травы хвоща полевого - 120-180 мгэкстракт листьев брусники - 100-150 мг в т.ч. арбутин - 8-12 мг - 100%1-150%(1),*Допускаются отклонения в соответствии с ТУ 10.89.19-503-21428156-2023.(1) % от адекватного уровня суточного потребления согласно "Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (Глава II, раздел 1, Приложение 5).* не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно "Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (Глава II, раздел 1, Приложение 5).Вспомогательные вещества: лимонная кислота и натрия гидрокарбонат (регуляторы кислотности), сорбит (носитель), мальтодекстрин, ароматизатор натуральный "Ягодный микс", полиэтиленгликоль (носитель), магния цитрат, натрия цитрат (носитель), сукралоза (подсластитель), полидиметилсилоксан (пеногаситель).Не содержит ГМО, сахар, лактозу, глютен, сою, красители.Допускаются отклонения в соответствии с ТУ 10.89.19-503-21428156-2023.1 % от адекватного уровня суточного потребления согласно "Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (Глава II, раздел 1, Приложение 5).* не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно "Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (Глава II, раздел 1, Приложение 5).Вспомогательные вещества: лимонная кислота и натрия гидрокарбонат (регуляторы кислотности), сорбит (носитель), мальтодекстрин, ароматизатор натуральный "Ягодный микс", полиэтиленгликоль (носитель), магния цитрат, натрия цитрат (носитель), сукралоза (подсластитель), полидиметилсилоксан (пеногаситель).Не содержит ГМО, сахар, лактозу, глютен, сою, красители.

Форма выпуска

Таблетки шипучие

Показания

В качестве биологически активной добавки к пище - источника арбутина.

Способ применения и дозы

Принимают внутрь, во время еды.Взрослым - по 2 таблетки 2-3 раза/сут в течение 10-30 дней. При необходимости курс приема можно повторить.Способ применения1 таблетку растворить в 100 мл воды комнатной температуры, полученный раствор размешать и растворить еще 1 таблетку (при растворении таблеток возможно образование пены), довести объем полученного раствора до 200 мл, перед употреблением размешать.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременным и кормящим женщинам принимать продукт по рекомендации и под наблюдением врача

Особые указания

Биологически активная добавка к пище, не является лекарственным средством.Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Продукт следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25° С.