Инструкция по применению
Деприм форте капсулы N20

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Словения
Производитель: Сандоз
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Зверобоя продырявленного травы экстракт
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 425 мг
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Зверобоя продырявленного травы экстракт

Состав

Сухой стандартизированный экстракт зверобоя (Hypericum perforatum) 425 мг,;в т.ч. гиперицин (общий) 1 мг;Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлоза, кальция гидрофосфата дигидрат, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат, тальк, желатин, натрия лаурилсульфат, вода, красители (диоксид титана (E171), хлорофиллово-медный комплекс (E141)), вода очищенная.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Деприм; не предоставлены.

Показания

— снижение настроения; — депрессивные состояния легкой и средней степени тяжести, сопровождающиеся тревогой (в т.ч. связанные с климактерическим синдромом); — повышенная чувствительность к перемене погоды.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1 таб. 3 раза/сут или по 1 капсуле 1 раз /сут (регулярно в одно и тоже время); при необходимости доза может быть увеличена до 2 капсул/сут (в 2 приема). Детям в возрасте от 6 до 12 лет - под медицинским контролем по 1-2 таб./сут утром и днем.; Оптимальный эффект достигается при регулярном приеме препарата в течение нескольких недель. Лечебное действие препарата Деприм; проявляется спустя 10-14 дней после начала приема.; При пропуске одного приема препарат следует принять как можно скорее. Если подходит время приема следующей дозы препарата, не следует принимать дополнительную дозу для компенсации пропущенного приема. Не следует принимать одновременно две дозы препарата.; Препарат следует принимать внутрь, запивая водой.

Противопоказания

— депрессии тяжелой степени; — детский возраст до 6 лет (для таблеток, покрытых оболочкой); — детский возраст до 12 лет (для капсул); — повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Несмотря на отсутствие данных о вредном воздействии препарата, прием Деприма при беременности и в период лактации возможен только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, запор.; Со стороны ЦНС: чувство усталости, беспокойство.; Аллергические реакции: гиперемия кожных покровов, кожный зуд.; Дерматологические реакции: у лиц с повышенной чувствительностью к солнечному свету одновременный прием препарата и солнечные ванны могут вызвать ожоги (фотосенсибилизация).

Передозировка

Симптомы: усиление описанных побочных эффектов, общая слабость, вялость, сонливость.; Лечение: отмена препарата, активированный уголь.; Острых отравлений препаратами зверобоя у людей не отмечено.

Взаимодействие с другими препаратами

Деприм; активирует микросомальное окисление (цитохром Р450), поэтому с осторожностью следует назначать препарат при одновременном приеме противосудорожных средств, антидепрессантов (ингибиторов обратного захвата серотонина), трициклических антидепрессанов, ингибиторов МАО, противомигренозных препаратов (триптанов), пероральных гормональных контрацептивов, сердечных гликозидов (в т.ч. дигоксин), теофиллина, циклоспорина, индинавира, резерпина.; При одновременном применении Деприм; может усиливать действие средств для общей анестезии и опиоидных анальгетиков.

Особые указания

Пациент должен быть предупрежден, что в случае отсутствия терапевтического эффекта в течение 4-6 недель после начала лечения следует прекратить прием Деприма и обратиться к лечащему врачу.; Пациентам, принимающим препарат, следует избегать пребывания на солнце и УФ-облучения (в т.ч. солярий).; Пациентам, принимающим препарат Деприм;, следует воздерживаться от употребления алкоголя.

Условия хранения

В сухом месте