Инструкция по применению
Деприм Таблетки 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Словения
Производитель: Сандоз
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Зверобоя продырявленного травы экстракт
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 60 мг
Срок годности: 36

Описание

Средство растительного происхождения. Содержит производные антрацена - главным образом гиперицин, псевдогиперицин; флавоноиды - гиперозид, кверцитин, рутин, изокверцитин, аментофлавон; ксантоны - 1,3,6,7-тетрагидрокси-ксантон; ацилхлороглуцинолы: гиперфорин с небольшими количествами адгиперфорина; эфирные масла; олигомеры; процианидины и другие катехиновые танины; производные кофеиновой кислоты, включая хлорогеновую кислоту. Оказывает мягкое антидепрессивное, седативное и анксиолитическое действие, а также стимулирующее действие на органы ЖКТ, кровообращение, общее тонизирующее действие. Полагают, что антидепрессивное действие растения обусловлено способностью его активных веществ ингибировать обратный захват серотонина и других нейротрансмиттеров, а также влиянием на обмен мелатонина. Благодаря высокому содержанию флавоноидов растение оказывает противовоспалительное действие. Установлено, что гиперфорин ингибирует рост грамположительных бактерий Streptococcus pyogenes и Streptococcus agalactiae. Показана эффективность гиперфорина в отношении пенициллин-резистентных штаммов и метициллин-резистентных штаммов Staphylococcus aureus.

Действующее вещество

Зверобоя продырявленного травы экстракт

Состав

Состав 1 таблетка содержит: Активные вещества: экстракт травы зверобоя не менее 60 мг, в т.ч. гиперицин (общий) не менее 0,3 мг. Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая - 63,25 мг, тальк - 10 мг, магния стеарат - 1 мг, кремния диоксид коллоидный (Aerosil 200) - 2,5 мг, лактоза (сито 70-100) - до 250 мг. Состав оболочки: гидроксипропилметилцеллюлоза (Pharmacoat 606) - 7,552 мг, глазурь зеленая (Sicopharm) - 0,835 мг, глазурь синяя (Sicopharm) - 0,085 мг, полиэтиленгликоль - 1,32 мг, титана диоксид - 1,209 мг, воск карнаубский - 0,045 мг, тальк - 0,045 мг, вода очищенная.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Снижение настроения. Депрессивные состояния легкой и средней степени тяжести, сопровождающиеся тревогой (в т.ч. связанные с климактерическим синдромом). Повышенная чувствительность к перемене погоды.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1 таб. 3 раза/сут; детям в возрасте от 6 до 12 лет - под медицинским контролем по 1-2 таб./сут утром и днем. Оптимальный эффект достигается при регулярном приеме препарата в течение нескольких недель. Лечебное действие препарата Деприм проявляется спустя 10-14 дней после начала приема. При пропуске одного приема препарат следует принять как можно скорее. Если подходит время приема следующей дозы препарата, не следует принимать дополнительную дозу для компенсации пропущенного приема. Не следует принимать одновременно две дозы препарата. Таблетки следует принимать внутрь, запивая водой.

Противопоказания

Депрессии тяжелой степени. Одновременный прием индинавира или других антиретровирусных препаратов (при терапии онкологических заболеваний или спид). Одновременный прием антидепрессантов-ингибиторов мао, циклоспорина (например, после трансплантации), препаратов, влияющих на свертываемость крови (варфарин или другие непрямые антикоагулянты). Детский возраст до 6 лет. Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Несмотря на отсутствие данных о вредном воздействии препарата, прием Деприма при беременности и в период лактации возможен только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, запор. Со стороны ЦНС: чувство усталости, беспокойство. Аллергические реакции: гиперемия кожных покровов, кожный зуд. Прочие: у лиц с повышенной чувствительностью к солнечному свету одновременный прием препарата и солнечные ванны могут вызвать ожоги (фотосенсибилизация).

Передозировка

Симптомы: усиление описанных побочных эффектов, общая слабость, вялость, сонливость. Лечение: отмена препарата, активированный уголь. Острых отравлений препаратами зверобоя у людей не отмечено.

Взаимодействие с другими препаратами

Деприм активирует микросомальное окисление (цитохром Р450), поэтому с осторожностью следует назначать препарат при одновременном приеме противосудорожных средств, антидепрессантов (ингибиторов обратного захвата серотонина), трициклических антидепрессанов, ингибиторов МАО, противомигренозных препаратов (триптанов), пероральных гормональных контрацептивов, сердечных гликозидов (в т.ч. дигоксин), теофиллина, циклоспорина, индинавира, резерпина. При одновременном применении Деприм может усиливать действие средств для общей анестезии и опиоидных анальгетиков.

Особые указания

БАД. Не является лекарственным средством.

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении