Инструкция по применению
Детримакс Таблетки 1000 МЕ 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Польша
Производитель: Грокам
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Холекальциферол
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 1000 МЕ

Действующее вещество

Холекальциферол

Состав

активное вещество: холекальциферол (витамин D3)25 мкг (1000 МЕ) вспомогательные вещества: орто-Фосфат кальция 2-замещенный (носитель); микрокристаллическая целлюлоза Е460 (антислеживающий агент) оболочка таблетки: гидроксипропилметилцеллюлоза Е464 (носитель); титана диоксид Е171 (краситель), полидекстроза Е1200 (стабилизатор); тальк Е553 (антислеживающий агент); мальтодекстрин; среднецепочечные триглицериды; магниевая соль стеариновой кислоты Е572 (стабилизатор)

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Витамин D3 — жизненно важный жирорастворимый витамин, необходимый для обеспечения деятельности практически всех органов и систем человеческого организма. Детримакс витамин D3 способствует поддержанию нормальной иммунной функции; укреплению костно-мышечной системы; повышению энергетического потенциала организма; поддержанию нормальной деятельности нервной системы; поддержанию нормальной репродуктивной функции, как у женщин, так и у мужчин. Важная дополнительная информация Эпидемиологические исследования, проведенные в России, установили, что сниженная концентрация витамина D в крови наблюдается у 50–92% взрослого населения трудоспособного возраста и детей, вне зависимости от сезона года. Причинами дефицита витамина D у большей части российского населения являются как недостаточное его потребление с пищей, так и низкий уровень его синтеза в коже вследствие географического расположения территории РФ (низкая инсоляция). Нарушения здоровья, ассоциированные с дефицитом витамина D Основным проявлением дефицита витамина D в детском возрасте является рахит, у взрослых — остеомаляция. У пожилых людей дефицит витамина D в первую очередь ассоциирован с мышечной слабостью, плохой физической функцией и нарушением баланса, повышенной хрупкостью костей. Комиссией по диетическим продуктам, питанию и аллергии Комитета по продовольствию Европейского ведомства по безопасности пищевых продуктов установлена связь между потреблением витамина D с пищей и его вкладом в нормальное функционирование иммунной системы и физиологической воспалительной реакции.

Показания

В качестве БАДа к пище — дополнительного источника витамина D

Способ применения и дозы

Внутрь, во время еды. Взрослым — по 1/2 табл. в день. Продолжительность приема — 1 мес. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Суточный прием (1/2 табл.) — 12,5 мкг (500 МЕ), что составляет 250%*от рекомендуемого уровня суточного потребления** . *Не превышает верхний допустимый уровень потребления, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза ЕврАзЭС. **ТР ТС 022/2011, «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

Применение при беременности и кормлении грудью

Продукт не имеет противопоказаний в период беременности, но принимать его следует с осторожностью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.