Инструкция по применению
Девирс Крем для наружного применения 7,5 % 15 г

Характеристики



Форма выпуска: Крем
Страна: Россия
Производитель: Вертекс
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Рибавирин
Количество в упаковке: 1

Действующее вещество

Рибавирин

Состав

Рибавирин 7.5 г. Вспомогательные вещества: глицерил моностеарат (глицерол моностеарат 40-50) - 2 г, макрогола-6 цетостеарилового спирта эфир (макрогола-6 цетостеариловый эфир) - 1.5 г, макрогола-25 цетостеарилового спирта эфир (макрогола-25 цетостеариловый эфир) - 1.5 г, цетостеариловый спирт - 5 г, парафин жидкий (масло вазелиновое) - 5 г, метилпарагидроксибензоат (метилгидроксибензоат, метилпарабен, нипагин) - 0.1 г, пропилпарагидроксибензоат (пропилгидроксибензоат, пропилпарабен, нипазол) - 0.02 г, вода очищенная - до 100 г.

Форма выпуска

Крем

Показания

В виде монотерапии или в комбинации с другими лекарственными формами рибавирина для приема внутрь и парентерального применения при следующих заболеваниях: инфекции кожи и слизистых оболочек, вызванные вирусами Herpes simplex 1 и 2 типов, различной локализации, в т.ч. в области гениталий опоясывающий герпес (в составе комплексной терапии).

Способ применения и дозы

Применяют наружно. Крем наносят на пораженные участки кожи и слизистой оболочки (предварительно вымытые и высушенные) равномерным тонким слоем, слегка втирая. Применять 5 раз/сут до полного исчезновения симптомов заболевания. При отсутствии улучшения в течение 8 дней применения препарата следует прекратить прием и обратиться к врачу. Для получения наилучшего эффекта лечение следует начинать как можно раньше при первом появлении симптомов заболевания. При применении крема Девирс в комбинации с одной из лекарственных форм рибавирина для приема внутрь или в/в введения дозу крема следует уменьшить.

Противопоказания

беременность период лактации (грудного вскармливания) детский и подростковый возраст до 18 лет повышенная чувствительность к рибавирину и другим компонентам препарата. С осторожностью следует применять препарат при почечной недостаточности, у женщин и мужчин репродуктивного возраста.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение крема при беременности и в период лактации противопоказано. Женщины и мужчины репродуктивного возраста во время лечения и в течение 7 месяцев после окончания терапии должны использовать эффективные контрацептивные средства.

Побочные действия

Аллергические реакции: возможна кожная сыпь, крапивница, экзантема. Прочие: выпадение волос, изменение содержания тиреотропного гормона (ТТГ). Крайне редко - симптомы аутоиммунных заболеваний. Наблюдаемые эффекты, как правило, обратимы, не влияют на эффективность лечения и прекращаются после окончания лечения.

Особые указания

Аллергические реакции: возможна кожная сыпь, крапивница, экзантема. Прочие: выпадение волос, изменение содержания тиреотропного гормона (ТТГ). Крайне редко - симптомы аутоиммунных заболеваний. Наблюдаемые эффекты, как правило, обратимы, не влияют на эффективность лечения и прекращаются после окончания лечения.