Инструкция по применению
Диарекс-Хималайя таблетки 100 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Индия
Производитель: Хималайя
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 100



Описание

Круглые двояковыпуклые таблетки без оболочки, от светло-коричневого до коричневого цвета с вкраплениями.

Состав

Каждая таблетка содержит: Активные компоненты: Экстракт из смеси растительного сырья Голаррены противодизентерийной коры 93,9% Holarrhena antidysenterica Wall. ex. A.DC. 261,0 мг Тиноспоры сердцелистной стеблей 6,1% Tinospora cordifolia (Willd.) Miers ex Hook. f. & Thoms Порошки Эгле мармеладного плодов Aegle marmelos (Linn.) Correa. ex Roxb 245,0 мг Граната обыкновенного кожуры плодов Punica granatum (Linn.) 82,0 мг Кальцинированной раковины моллюска 61,0 мг Сыти круглой клубней Cyperus rotundus (Linn.) 51,0 мг Вспомогательные вещества: кросповидон, кремния диоксид коллоидный, кармеллоза натрия, магния стеарат.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Диарея различного происхождения: пищевая, аллергическая, инфекционная (бактериальная, протозойная, вирусная). Синдром раздраженного кишечника. Дисбактериоз. Препарат применяется в составе комплексной терапии в качестве вспомогательного средства лечения.

Способ применения и дозы

Внутрь. Между приемами пищи. Детям от 6 до14 лет — по 1 таблетке 2 раза в день. Взрослым и детям старше 14 лет — по 2 таблетки 2 раза в день. Продолжительность курса лечения острой диареи — 2–7 дней. Продолжительность курса терапии хронической диареи, синдрома раздраженного кишечника, дисбактериоза — от 2 до 6 недель. В случае необходимости после 2-х недельного перерыва курс терапии может быть повторен. При тяжелых формах диареи частоту и продолжительность приема можно увеличить.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, кишечная непроходимость, острая дизентерия со стулом с примесью крови и лихорадкой. Детский возраст до 6 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется назначать препарат беременным. В период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Данные о передозировке отсутствуют. В случае передозировки применяется симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими препаратами

Возможно использование препарата с другими лекарственными средствами, применяемыми для купирования синдрома диареи. Применение препарата в комплексе с антибиотиками, противовирусными средствами и кишечными антисептиками повышает эффективность терапии и снижает выраженность побочных эффектов химиотерапии. Совместное применение с адсорбентами, вяжущими и обволакивающими средствами может привести к снижению эффективности препарата, поэтому между приемом препарата и адсорбента должно пройти не менее 3 часов.

Особые указания

Необходимо отслеживать симптомы нарушения водно-электролитного баланса и принимать меры по их устранению путем возмещения потерянной жидкости и электролитов. Если в течение трех дней лечения симптомы диареи не исчезают, состояние больного ухудшается, прием препарата следует прекратить и обратиться к терапевту, инфекционисту или гастроэнтерологу.

Срок хранения после открытия

3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

В сухом месте при температуре от 10 °С до 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.