Инструкция по применению
Диазолин Драже 100 мг 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Драже
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Мебгидролин
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 100 мг

Описание

Драже от белого или белого с желтоватым оттенком цвета правильной шарообразной формы. На поперечном разрезе драже белого или белого со слегка кремоватым или слегка зеленоватым оттенком цвета.

Действующее вещество

Мебгидролин

Состав

Активное вещество: Мебгидролина нападизилат - 50,0 мг или 100,0 мг.
Вспомогательные вещества: сахароза (сахар) , патока крахмальная , повидон (поливинилпирролидон , подсолнечники масло , воск пчелиный , тальк

Форма выпуска

Драже

Фармакокинетика

Быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), проникает во все ткани организма, однако практически не проникает через гемато-энцефалический барьер. Биодо-ступность составляет 40-60 %. Препарат метаболизируется в печени путем метилирования, индуцирует микросомальные ферменты печени, выводится почками. Период полувыведения (T1/2) из плазмы составляет около 4 ч.

Показания

Поллиноз (сенная лихорадка), аллергический конъюнктивит, краливница, лекарственная сыпь, кожная реакция после укуса насекомого, аллергодерматозы, сопровождающиеся кожным зудом.

Способ применения и дозы

Внутрь, не разжевывая, во время или сразу после еды. Взрослым и детям старше 12 лет: по 100 мг 1-3 раза в день. Максимальная разовая доза — 300 мг, максимальная суточная доза — 600 мг. Длительность лечения определяется характером заболевания и достигнутым терапевтиче-ским эффектом. У детей препарат применяется в зависимости от возраста: для детей в возрасте от 3 до 60 - по 50 мг 1-2 раза в день, от 5 до 10 лет - по 50 мг 2-3 раза в день, от 10 до 12 лет — по 50 мг 2-4 раза в день.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, гиперплазия предстательной железы, закрытоугольная глаукома, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, вос-палительные заболевания ЖКТ, пилоростеноз, эпилепсия, нарушения сердечного ритма, беременность, период лактации, детский возраст до 3-х лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан во время беременности и в период лактации

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: диспепсические явления, обусловленные раз-дражающим действием препарата на слизистую оболочку ЖТ (изжога, тошнота, боли в эпигастральной области). Со стороны нервной системы: головокружение, парестезии, тремор, повышенная утом-ляемость, сонливость, тревожность (по ночам), замедление скорости психомоторных ре-акций. Прочие: сухость во рту, задержка мочи, аллергические реакции, крайне редко - грануло-цитопения и агранулоцитоз. У детей возможны парадоксальные реакции: повышенная возбудимость, раздражитель-ность, тремор, нарушения сна.

Передозировка

Данных о передозировке нет.

Взаимодействие с другими препаратами

Усиливает действие этанола, седативных средств.

Особые указания

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышен-ной концентрации внимания и высокой скорости психомоторных реакций.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 ос. Хранить в недоступном для детей месте.