Инструкция по применению
Диазолин таблетки 50 мг 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Обнинская химико-фармацевтическая компания
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Мебгидролин
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 50 мг
Срок годности: 2.0

Описание

Блокатор гистаминовых Н1-рецепторов. Противоаллергический препарат

Действующее вещество

Мебгидролин

Состав

Мебгидролин

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

После приема внутрь быстро абсорбируется из ЖКТ. Биодоступность составляет 40-60%. Практически не проникает через ГЭБ. Метаболизируется в печени путем метилирования. Вызывает индукцию микросомальных ферментов печени. Выводится почками.

Показания

Сенная лихорадка, крапивница, экзема, кожный зуд, аллергический ринит, аллергический конъюнктивит, кожная реакция после укуса насекомого, бронхиальная астма (в составе комбинированной терапии).

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 10 лет - 100-300 мг/сут. Суточная доза для детей в возрасте 5-10 лет - 100-200 мг, 2-5 лет - 50-150 мг, до 2 лет - 50-100 мг.

Противопоказания

Гипертрофия предстательной железы, закрытоугольная глаукома, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, воспалительные заболевания ЖКТ в фазе обострения, повышенная чувствительность к мебгидролину, пилоростеноз, эпилепсия, нарушения сердечного ритма (обладая ваголитическим действием, может улучшать AV-проводимость и способствовать развитию наджелудочковых аритмий), беременность, период лактации.

Применение при беременности и кормлении грудью

Мебгидролин противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: редко - сухость во рту, диспептические явления вследствие раздражения слизистой желудка. Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: возможны головокружение, парестезии, повышенная утомляемость, тремор, сонливость. Со стороны системы кроветворения: в единичных случаях - гранулоцитопения, агранулоцитоз. Со стороны мочевыделительной системы: в единичных случаях - дизурия.

Взаимодействие с другими препаратами

Мебгидролин усиливает действие седативных средств и этанола.

Особые указания

С осторожностью применяют при печеночной и/или почечной недостаточности (может потребоваться коррекция дозы и интервалов между приемами).В период лечения следует воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций (вождение транспортных средств или работа с механизмами).

Условия хранения

Беречь от детей. При комнатной температуре.