Инструкция по применению
Диазолин Фармстандарт Драже 50 мг 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Мебгидролин
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 50 мг

Описание

Драже белого или белого с желтоватым оттенком цвета шарообразной формы. На поперечном разрезе драже белого или белого со слегка кремоватым или слегка зеленоватым оттенком цвета.

Действующее вещество

Мебгидролин

Состав

Активное вещество: Мебгидролина нападизилат - 50 мг Вспомогательные вещества: Сахароза (сахар), патока крахмальная, повидон (подиви нилпирролидон), подсолнечника масло, воск пчелиный, тальк.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), проникает во все ткани организма, однако практически не проникает через гемато-энцефалический барьер. Биодоступность составляет 40-60%. Препарат метаболизируется в печени путем метилирования, индуцирует микросомальные ферменты печени, выводится почками. Период полувыведения (T|я) из плазмы составляет около 4 ч.

Показания

Поллиноз (сенная лихорадка), аллергический конъюнктивит, крапивница, лекарственная сыпь, кожная реакция после укуса насекомого, аллергодерматозы, сопровождающиеся кожным зудом.

Способ применения и дозы

Внутрь, не разжевывая, во время или сразу после еды. Взрослым и детям старше 12 лет: по 100 мг 1 -3 раза в день. Максимальная разовая доза - 300 мг, максимальная суточная доза - 600 мг. Длительность лечения определяется характером заболевания и достигнутым терапевтическим эффектом. У детей препарат применяется в зависимости от возраста: для детей в возрасте от 3 до S лет - по 50 мг 1 -2 раза в день, от 5 до 10 лет - по 50 мг 2-3 раза в день, от 10 до 12 лет - по 50 мг 2-4 раза в день.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, гиперплазия предстательной железы, закрытоугольная глаукома, язвенная болезнь желудка н 12-перстной кишки, воспалительные заболевания ЖКТ, пилоростеноз, эпилепсия, нарушения сердечного ритма, беременность, период лактации, детский возраст до 3-х лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется принимать в период беременности и лактации.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: диспепсические явления, обусловленные раздражающим действием препарата на слизистую оболочку ЖКТ (изжога, тошнота, боли в эпигастральной области). Со стороны нервной системы: головокружение, парестезии, тремор, повышенная утомляемость, сонливость, тревожность (по ночам), замедление скорости психомоторных реакций. Прочие: сухость во рту, задержка мочи, аллергические реакции, крайне редко - гранулоцитопения и агранулоцитоз. У детей возможны парадоксальные реакции: повышенная возбудимость, раздражительность, тремор, нарушения сна.

Передозировка

Данных о передозировке нет.

Взаимодействие с другими препаратами

Усиливает действие этанола, седативных средств.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25оС. Хранить в недоступном для детей месте.